

Resultados

SISVEA 2020

Jalisco



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco



Salud



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
JUSTIFICACIÓN.....	3
INDICADOR: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	23
SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA	83
SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA	135
INDICADOR SERVICIO MÉDICO FORENSE.....	189
CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS.....	253
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	269
DIRECTORIO.....	291

Mensaje del Secretario Técnico:

Con el objetivo de conocer y monitorear de cerca el uso y abuso de drogas, en Jalisco continuamos aplicando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que como herramienta epidemiológica nos brinda información sobre los indicadores que tienen que ver de manera directa con su consumo.

Con el indicador del SISVEA, Tratamiento y Rehabilitación, conocemos el perfil sociodemográfico del paciente, patrón del consumo de drogas, droga de inicio, droga de mayor impacto y la de mayor consumo, detectamos los cambios en las vías de administración, nombres coloquiales y patrón de consumo, así como situaciones de riesgo, en cuanto al uso de drogas intravenosas.

El año 2020, durante la pandemia del SARS-Cov2 o COVID-19 representó un gran desafío ya que muchos usuarios de sustancias adictivas no acudieron a solicitar apoyo para ser atendidos por problemas de consumo de sustancias adictivas, lo que se refleja en el menor número de pacientes atendidos con referencia al año 2019,

Así mismo debido a la reconversión de Hospitales y Unidades de Urgencias Médicas y la re estructuración del personal de éstas para la atención de pacientes con infección por coronavirus no se aplicó el indicador Puesto Centinela de Urgencias.

En el indicador Forense, nos marca la prevalencia de personas mayores de 5 años que pierden la vida bajo el efecto de drogas, así como la causa de ésta.

Sin duda el consumo de sustancias afecta de manera negativa cualquier área del ser humano, tanto en su salud física, familiar y social. Las ventajas de este sistema es que ofrece información de manera continua nos permite contar con información por Región Sanitaria y un panorama de lo que sucede en Jalisco, lo que favorece el desarrollo de actividades en prevención, capacitación, tratamiento, rehabilitación y la reinserción social del usuario.

Por lo anterior, exhorto a todos los establecimientos que atienden a pacientes con problemas uso y abuso de drogas, continúen participando de manera activa con el registro de cada uno de los casos que se atiendan en nuestro Estado.

Así mismo pongo a sus órdenes esta información para que la utilicen en el desarrollo de proyectos y programas que se expresen en acciones que beneficien a la población en Jalisco.

Lic. Pedro Briones Contreras
Secretario Técnico



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Edición junio 2021.

Coordinación Editorial.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Edición.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

L.T.S. María Patricia Carlín Sánchez.

Mtro. Aurelio Martínez García

Mtra. Adriana Ramona Leyva Luna

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Claudia Mónica Prado Palacios.

Imagen del Documento:

Claudia Mónica Prado Palacios.

Producción Software Interactivo.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

D.R. Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Lago Tequesquitengo 2600, Colonia Lagos del Country. Zapopan Jalisco México.

800 536 94 44, 33 38 23 20 20

Hecho en México.

Citación sugerida: Briones Casillas P, Robles-Arellano LJ, Gómez-Sandoval G, Carlín-Sánchez MP, Martínez-García A. Leyva, Maury-Hernández HE. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, Resultados 2020. Secretaría de Salud Jalisco.

ISBN en trámite

Colaboradores del SISVEA por Región Sanitaria.

Región Sanitaria I Colotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Colotlán.

Lic. Ana Hilda Luna López

Lic. TS. Maribel Vargas Franco.

Región Sanitaria II Lagos de Moreno.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Lagos de Moreno.

Lic. Norma Angélica Nava Neri.

Lic. Rocelia Huerta Martín

María Eugenia de la Cruz Vázquez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de San Juan de los Lagos.

Mtra. Margarita González de la Torre.

Lic. TS. Guadalupe Lilibiana Murillo Mares.

Región Sanitaria III Tepatitlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tepatitlán de Morelos.

Lic. Víctor Daniel Sánchez Esqueda

Eduardo Javier Hernández Orozco.

Lic. María del Refugio Villaseñor Tavera

Lic. Yolanda Baltazar Cruz.

Lic. Norma Lilia Delgadillo Perales.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Arandas

Lic. Paola Saraí Ramírez Ascencio.

Lic. Erika Fabiola García Villa.

Lic. José Manuel Ramírez Betancourt.

Región Sanitaria IV La Barca

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ocotlán.

Lic. José Antonio Reynaga Castellanos

Lic. TS. Verónica Gallardo López.

Región Sanitaria V Tamazula.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tamazula de Gordiano.

Lic. Psic. Gilberto de Jesús García Medina.

Lic. TS. Marcela de Jesús Ávalos Hernández.

Región Sanitaria VI Zapotlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapotlán el Grande

LTS José Antonio Álvarez Moreno.

Lic. Silvia Lorena Rodríguez Sandoval

Región Sanitaria VII Autlán.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán de Navarro.

Mtro. Jorge Jiménez Aguilar

Lic. T.S. Griselda Bartolo Ramos.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de La Huerta.

Lic. Refugio Covarrubias Romero

Lic. José Octavio Guerrero Tejeda.

Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Puerto Vallarta.

Mtra. Lorena Tirado Fuentes.

Lic. TS. Xochiquetzal Pedro Gutiérrez.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Mascota.

Lic. José Benito González Garibaldi.

Lic. Ana Genoveva Robles Gavilán

María de los Ángeles Ramírez Fuentes

Región Sanitaria IX Ameca.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Ameca

Ing. Sergio Raúl Orozco Andalón

Lic. Carmen Dolores Becerra Ávila.

Lic. TS. Luz Marina Medina Nuño.

Lic. Francisco Javier Calata Padilla.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Región Sanitaria X Zapopan.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Zapopan I.

Dra. Laura Graciela Torres Rodríguez.

Brenda Martínez Prado.

María Magdalena Negrete Solorio.

José Francisco Pérez y Pérez

Centro de Atención Primaria en Adicciones Zapopan II.

Lic. Carlos Torres Beltrán.

Lic. TS. Irma Aracely Almaral Rodríguez.

Lic. Judith Velazco Gibbens

Región Sanitaria XI San Pedro Tlaquepaque.

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlaquepaque

Mtra. Blanca Gabriela López Maciel

Lic. TS. Jeannie Oseguera Jiménez.

Lic. TS. Araceli Carrillo Ramírez.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Centro de Atención Primaria en Adicciones de Tlajomulco.

Mtro. Raúl Rosete Ramírez.

Jorge Antonio Hernández García.

Región Sanitaria XII Tonalá.

Centro Nueva Vida de Tonalá I.

Lic. Sergio Martínez Arellano.

Lic. TS. Martha Leonor Hernández Orozco.

Centro Nueva Vida de Tonalá II.

Lic. Gustavo Guzmán Félix.

LTS. Cindy Adriana Ríos Hernández.

Lic. TS. Sonia Karina Fregoso Flores.



SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Región Sanitaria XIII Guadalajara.

Centro de Atención Primaria en Adicciones Guadalajara

Lic. Adalberto Muñoz Márquez

Lic. María del Pilar Magaña Domínguez

Lic. TS. Araceli Ramos Corona

Secretariado Técnico

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Mtro. Aurelio Martínez García

Mtra. Adriana Ramona Leyva Luna

Lic. María Patricia Carlín Sánchez.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández

Claudia Mónica Prado Palacios

PRESENTACIÓN

El estado de Jalisco se encuentra ubicado en los primeros lugares de consumo de sustancias adictivas en cualquier patrón de consumo de acuerdo a lo publicado por La Encuesta del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), donde se reporta que la incidencia acumulada en el consumo de drogas ilegales en población de 12 a 65 años a nivel nacional alcanzó el 9.9% y en Jalisco el 15.3%, en el uso de marihuana el 12.2%, cocaína el 6.9%, y los estimulantes de tipo anfetamínico el 2%.

El comportamiento del consumo tiene similitudes pero también diferencias con otros estados, con incidencias acumuladas en el consumo de sustancias adictivas, pero cada Estado o región tiene sus particularidades en cuanto a los tipos de drogas, patrón de consumo, formas y vías de administración, lo que da al fenómeno características propias que hace necesario estudiarlas de manera más cercana en cada Estado.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) aporta los datos relacionados con las sustancias asociados a las personas que acuden a solicitar tratamiento en nuestro Estado por problema de consumo de éstas.

El SISVEA tiene su origen en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el año de 1990 con el objetivo de contar con un diagnóstico actualizado, anual de los indicadores de salud relacionados con el uso y abuso de drogas.

En 1994 la NOM 017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica establece que este sistema es parte del SINAVE y la notificación adquiere un carácter obligatorio de los casos atendidos en las entidades federativas.

En el año 2009 debido a las necesidad de contar con un nuevo sistema informático que estuviera acorder con un nuevo sistema informático se integra el Instituto Nacional de Salud Publica en la generación y modificación del Sistema de tecnológico de captura y análisis, herramienta que nos permite realizar análisis esecífico en cada una de las áreas que coordinan los registros y captura de información.

El programa ha evolucionado en la información como la fusión de cédulas de Hospitales Psiquiátricos, Alcohol y Tabaco en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación en el año 2010 así como el Sistema de Captura, en el año 2017 también se modifican la cédula de los 4 indicadores que lo conforman.

En 2017 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informa que solo se deberá contar con información de los Centros de Tratamiento no Gubernamentales, lo cual limita a este programa para contar con información de las 13 Regiones Sanitarias

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

El SISVEA, cuenta con la información de cuatro indicadores de los cuales dos se aplican en las 13 Regiones Sanitarias del Estado. Nos permite identificar el perfil sociodemográfico del usuario, la tendencias de consumo y vías de administración, el patrón de consumo por sexo, escolaridad y grupo de edad.

El SISVEA es un fuente de información para los tomadores de decisiones y desarrolladores de programas preventivos en localidades, municipios así como para el Observatorio Mexicano de Drogas (OMD) que tiene como objetivo contar con un diagnóstico epidemiológico oportuno y confiable en el ámbito de las adicciones, desde municipio, región sanitaria y estado y a nivel nacional.

El SISVEA continúa siendo un referente en información en materia de adicciones ya que ninguna otra fuente de información tiene acceso a población tan específica como los usuarios de drogas con adicciones severas.

Durante el año 2020 se reduce de manera importante la asistencia a tratamiento de tipo residencial debido a lo ocasionado por la pandemia de Coronavirus responsable de la infección de SARS Cov-2, no todos los establecimientos pudieron cumplir con las recomendaciones sanitarias para evitar la cadena de contagios y algunos centros de tratamiento se vieron obligados a cerrar actividades, por lo que en esta ocasión no se realizó la Semana Puesto Centinela de Urgencias.

JUSTIFICACIÓN

El consumo de sustancias adictivas tiene repercusiones en la salud física y mental, además se asocia a problemas sociales como violencia familiar, violencia social, además se asocia a la morbilidad y mortalidad en la población y sobre todo en la juventud y adolescencia.

En las tendencias en la incidencia acumulada reportadas en la ENCODAT 2016 – 2017, Jalisco se encuentra ubicado dentro de los primeros 5 lugares en consumo de drogas ilegales, cualquier droga y marihuana. Sin embargo, en el uso de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) es de observar que las tendencias tienden a reducirse, e incluso en los menores de 17 años no se reportaron consumo en el patrón de consumo último año.

En las tendencias entre las encuestas 2008, 2011 y 2016-2017 se aprecian cambios significativos en estas sustancias, sin embargo, la información se genera cada 5 años en promedio desde que se inició con la Encuesta Nacional Contra las Adicciones. (ENA)

Como se mencionó anteriormente el fenómeno adictivo es un problema de salud pública en movimiento constante en los tipos de drogas, formas de presentación, vías de administración, mezclas y situaciones de riesgo, enfermedades situaciones de urgencias y mortalidad especialmente por accidentes, homicidios y suicidios.

Para intervenir de manera más eficaz a este complejo fenómeno es necesaria información actualizada sobre el problema y así direccionar o redirigir las estrategias de intervención tanto en prevención, tratamiento, rehabilitación, pero también sobre capacitación.

El SISVEA se desarrolla en la Dirección General de Epidemiología en el año 1991, integrado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE. Los datos registrados aportan información que además de conocer lo que sucede en Jalisco y sus Regiones contribuye al comportamiento a nivel nacional, e internacional.

Los resultados que se dan a conocer a todos los sectores de la población a través de información electrónica para el desarrollo de programas que dirigidos a prevenir el uso y abuso de sustancias adictivas acordes a las necesidades de cada una de las regiones del estado de Jalisco.

La importancia de la permanencia del sistema estriba en que ha generado información desde el año de 1994, por lo que contamos con información epidemiológica desde hace ya 21 años y publicado en el portal del CECAJ desde el año 2002.

Hasta el momento se cuenta con la participación de 116 establecimientos especializados en adicciones.

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Instituciones y Organismos Civiles que colaboran con el SISVEA; 103 en el Indicador de Tratamiento y Rehabilitación y el Servicio Médico Forense de Zona Metropolitana de Guadalajara.

Es importante mantener este Programa funcionado de manera permanente para lograr una vigilancia epidemiológica del Estado sobre el comportamiento del fenómeno adictivo. Asimismo, mantener capacitado a nuestros recursos humanos para que tengan mejores oportunidades de tratar el problema de manera profesional tanto en el ámbito preventivo, curativo y de reinserción social.

Este sistema se apega al **Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030**, el cual tiene el propósito de mejorar la salud de los Jaliscienses con servicios basados en la equidad, calidad, calidez y humanismo y con plena participación de la sociedad civil organizada.

El Secretariado Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, coordina y opera este sistema, lo cual garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados y promueve la continuidad, ya que es un procedimiento de concentración de información que tiene como premisa la actualización de los datos; nos queda claro que no basta contar con la información científica, sino saber qué hacer con ella para que ésta cumpla su cometido primordial para la planeación de programas de prevención y la toma de decisiones en Jalisco y en nuestro país.

MÉTODO

El SISVEA es un programa bien establecido que se aplica en todo el país, en Jalisco se aplica, desde hace años el indicador de consumo de drogas en las 13 Regiones Sanitarias que conforman el Estado, dándonos así un panorama epidemiológico, Estatal, Regional y Local de la dimensión del problema.

Estas Regiones son estudiadas a través de los **Centros de Atención Primaria en Adicciones**, quienes tienen la coordinación de los establecimientos que brindan atención en adicciones en la Región Sanitaria donde se encuentran ubicados.

El SISVEA cuenta con cuatro indicadores que buscan información de tipo socio demográfico como son: el patrón de consumo, sustancia y edades de inicio y la morbilidad relacionada con las sustancias de abuso.

Las cédulas se aplican por personal capacitado, exclusivamente en Centros de Tratamiento para enfermos de Alcoholismo, Tabaquismo y Farmacodependencia, en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico de Menores Infractores y Penitenciarios, -Clínicas de Tabaquismo, Servicio Médico Forense y para el indicador "Puesto Centinela de Urgencias" se aplican en Hospitales que cuenten con servicios de urgencias médico-quirúrgicas; para cada uno de ellos se cuenta con una cédula específica.

Las cédulas en este 2020 se capturan para el caso de la información de los Centros de Atención Primaria en Adicciones y de Centros de Integración Juvenil en el Programa CT_SISVEA y del resto de establecimientos que aportan al SISVEA es a través de la plataforma ubicada en <http://sisvea.sinave.gob.mx/> a la fecha en los cuatro indicadores, así mismo el programa de captura a CT_SISVEA, la información que se envía a la Dirección General de Epidemiología se excluye la información de los Centros de Atención Primaria en Adicciones y los Centros de Integración Juvenil sin embargo se incluyen en esta edición para continuar contando con información que represente a la mayor parte del Estado y a sus regiones sanitarias.

Una vez capturadas se revisa la base de datos la cual es enviada a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien almacena y procesa el SISVEA con resultados nacionales.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Contar con un diagnóstico actualizado, periódico, oportuno y confiable, que nos permita conocer las situaciones asociadas directa o indirectamente con el uso y abuso del consumo de sustancias que causan adicción en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en las Regiones del Estado para contar con un panorama general en Jalisco y contribuir con información a nivel nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, como un sistema único y de información continua para contar con un diagnóstico actualizado de las adicciones en Jalisco y sus Regiones.
- Generar información periódica y ágil sobre la prevalencia, incidencia y características del consumo de alcohol, tabaco, drogas médicas e ilícitas.
- Detectar con oportunidad los cambios en los patrones de consumo de alcohol, tabaco y drogas tanto médicas como ilegales.
- Identificar los patrones de riesgo de morbilidad asociados al uso y abuso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas.
- Registrar el consumo de drogas o mezclas nuevas.
- Generar hipótesis y proponer protocolos de investigación epidemiológica asociados al consumo de sustancias adictivas.

- **ESTRATEGIAS**

- Para todos los indicadores y estrategias desarrolladas se aplica la siguiente metodología:
- Se asesoró y capacitó a todas las Instituciones y Organismos que nutren este Sistema.
- Los Centros de Atención Primaria en Adicciones, recaban información de los centros de tratamiento que se encuentran ubicados dentro del área de competencia, quienes capacitan y recaban las cédulas generadas por cada establecimiento, entregando acuse de recibo.
- Las cédulas específicas para cada indicador son llenadas por personal capacitado de las Instituciones y Organismos no Gubernamentales y se aplican a los pacientes que acuden de los diferentes Establecimientos que colaboran con el SISVEA.
- Para el caso del indicador de mortalidad, la cédula se llena por un médico capacitado y se obtiene la información de los registros del Servicio Médico Forense.
- El proceso de los fluidos corporales para detectar sustancias adictivas lo realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de donde se toman los resultados.
- Las cédulas se recaban en forma mensual en las oficinas del CECAJ y CAPA's quienes revisan que esté llena de manera completa y correcta.
- Se entrega un acuse de recibo al Centro de Tratamiento especificando el número de cédulas, mes y por grupo de edad.
- Las cédulas se codifican de acuerdo al manual del SISVEA 2017, el cual es utilizado en toda la República y la información se captura en el equipo de cómputo utilizando el programa Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones y con tablas dinámicas del programa de Excel.
- La información se revisa y corrige, para tener una base de datos correcta y confiable.
- Se informa por escrito de los avances en forma mensual al Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.
- Se realiza el informe por escrito de los resultados arrojados al finalizar el año de estudio.
- Se retroalimenta con el análisis de resultados arrojados por el SISVEA a las autoridades del Estado, las Instituciones y Organismos que nutren el Sistema.
- Los resultados se difunden a nivel Regional, Estatal y Nacional en forma anual.
- El proceso se evalúa de acuerdo a los criterios del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Programa "Caminando a la Excelencia" en forma mensual.

INDICADORES DEL SISVEA

Los objetivos estratégicos se logran a través de los siguientes indicadores.

- Centros de Tratamiento y Rehabilitaciónno Gubernamentales (alcohol, tabaco y drogas médicas e ilícitas).
- Clínicas contra el tabaquismo.
- Consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilícitas en Menores Infractores y Centros Penitenciarios.
- Enfermedades y lesiones de causa externa. (Puesto Centinela de Urgencias Médicas)
- Mortalidad en individuos usuarios de drogas. (Forense)

Indicador:

Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales.

Se captó la población que acude a los diferentes Establecimientos que brindan Tratamiento y Rehabilitación por consumo de sustancias adictivas, permitiendo así conocer el perfil socio demográfico de los usuarios de drogas, antecedentes de búsqueda de apoyo, el patrón de consumo, edad de inicio, tipo de droga utilizada y droga de mayor impacto, situaciones de consumo de riesgo, como compartir jeringas, lugares donde las consiguen y consumen con mayor frecuencia y dependencia a la droga de impacto.

La información fue obtenida a través de la aplicación de la cédula específica a los pacientes que ingresan a los Establecimientos de Tratamiento que están en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM 028 para el Control de las Adicciones (NOM 028-SSA2-1999) por presentar problemas con el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, por el personal de cada Centro, éstos a su vez han sido capacitados y asesorados en forma permanente por el personal del SISVEA y de Centros de Atención Primaria de Adicciones.

Las cédulas se recabaron en forma mensual por personal del CECAJ a través de visitas y/o citas mensuales, para el caso de los Establecimientos que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los recaban los Centros de Atención Primaria en Adicciones ubicados en la Región Sanitaria según le corresponda.

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CIVILES QUE PARTICIPAN EN EL SISVEA

Indicador “Tratamiento y Rehabilitación”

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
001	INTEGRACIÓN EN RECUPERACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS DE JALISCO, A.C. IRA
002	DROGADICTOS ANÓNIMOS, A.C. GRUPO PROVIDENCIA
003	GAMA Y ZÁFIRO A. C.
004	EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y DE SERVICIO A. C.
005	RETO A LA ESPERANZA, A.C.
008	CENTRO DE DESARROLLO PARA LAS MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. A. C.
011	CENTRO DE RECUPERACIÓN EL GRULLO A.C.
014	CENTRO DE DESARROLLO PARA JÓVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.
016	JÓVENES ALCOHÓLICOS Y ADICTOS GUADALAJARA A.C.
017	CREEAD POLARIS A.C.
018	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR A.C.
023	LA GUERRA CRISTIANA A.C.
024	CENTRO DE TRATAMIENTO VOLVER A NACER A. C.
025	CRISTO ESPERANZA DE VIDA NUEVA A.C.
026	C.T. GUERREROS DE LA LUZ, A.C.
027	C.T. LA VISIÓN DEL MAÑANA, A.C.
028	GRUPO HACIA UN NUEVO HORIZONTE A.C.
031	HACIENDA DEL LAGO
034	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ENFERMEDADES ADICTIVAS A.C.
035	AGUA VIVA A.C.

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
036	LA PRÓXIMA FRONTERA A.C.
037	MISIÓN Y VIDA A. C.
039	SER LIBRE REENCONTRANDO EL CAMINO
041	MÉXICO ME NECESITA
042	GRUPO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS BLOKE DE OCCIDENTE, A.C.
043	CAMINO NUEVO
045	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A. C.
047	NUEVO AMANECER A.C.
048	OBRA SOCIAL HACIENDA DE LA ESPERANZA, A.C.
051	ESPERANZA DE VIVIR LIBRE A.C.
055	GRUPO PÉRLA DE OCCIDENTE FEMENIL
056	GRUPO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS BLOKE DE OCCIDENTE, A.C.
057	GRUPO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS BLOKE DE OCCIDENTE, A.C.
058	GRUPO A.A. LA PERLA DE OCCIDENTE A.C. LA MATRIZ AMPLIACIÓN 4
062	MIDRASH VARONIL A.C.
063	CRREAD ZONA UNO A.C.
064	CRREAD ZONA UNO A.C. CHAPALA
065	LA PRÓXIMA FONTERA (AHUALULCO DEL MERCADO)
067	GRUPO JALISCO SIN ADICCIONES A. C.
068	GAMA Y ZAFIRO A. C.
069	INFINITA NECESIDAD DE AMOR. A.C.
070	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C. FEMENIL

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
071	CRREAD A. C. ZONA UNO A.C.
072	POLARIS FEMENIL
073	ALBERGUE LA LUZ DE LA ESPERANZA A.C.
080	GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS PERLA DE OCCIDENTE
82	CAPA A.C. CENTRO DE APOYO A PERSONAS CON PLOBLEMAS DE ADICCIÓN
85	CLÍNICA DE SALVACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS DE OCEANÍA A.C.
89	CENTRO DE REHABILITACIÓN AMOR POR VIVIR A.C.
90	GENERANDO FAMILIAS A.C.
91	CENTRO DE REHABILITACIÓN AMOR POR VIVIR A.C.
93	CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN MICHOACÁN A.C.
95	CAMPO RESPLENDOR
96	ALBERGUE REENCUENTRO FAMILIAR A.C.
97	CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN DEL PACÍFICO A.C.
98	ALBERGUE REENCUENTRO FAMILIAR A.C.
101	LIBRE PARA TRASCENDER A.C.
104	COMUNIDAD TERAPÉUTICA BEETANIA, A.C.
107	CENTRO DE REHABILITACIÓN NAVARRO, A.C.
109	MOND PHASE A.C.
113	COMUNIDAD TERAPÉUTICA LA VISIÓN DEL MAÑANA, A.C.
114	VIDA, LIBERTAD Y ALEGRÍA, A.C.
118	JÓVENES OCCIDENTE ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS ANÓNIMOS SERVICIOS GRATUITOS, A.C.
121	LA PRÓXIMA FRONTERA A.C.

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
122	LIBRES PARA AMAR A. C.
123	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ENFERMEDADES ADICTIVAS A.C. DIOS POR SIEMPRE
128	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD A.C.
129	UN NUEVO DESTINO EN MI VIDA, A.C.
130	CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN MICHOACÁN, A.C.
136	GRUPO AMANCER 24 HORAS DE DROGADICTOS ANÓNIMOS
137	REHABILITACIÓN ARMÓNICA A.C.
140	TENER SALUD ES MI ESPERANZA A. C.
141	RENACIMIENTO INTERNO EN EL ALMA, A.C.
143	MI FAMILIA ME ESPERA A.C.
144	COMUNIDAD TERAPÉUTICA NUEVO SENDERO A. C.
145	CASA OASIS, A.C.
146	COMENZANDO A VIVIR A.C.
147	MINISTERIO MANANTIAL DE AMOR, A.C.
148	CENTRO CLÍNICO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES LA FRATERNIDAD DE LA LUZ. A. C. FEMENIL
149	CENTRO CLÍNICO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES LA FRATERNIDAD DE LA LUZ. A. C. VARONIL
150	MONTE AVVJR, A.C.
151	GRUPO JÓVENES TEPATITLÁN ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS ANÓNIMOS DE SERVICIOS GRATUITOS, A.C.
153	CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN GARCÍA, A.C.
154	CENTRO DE TRATAMIENTO MI REINSERCIÓN A.C.
155	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS A.C.
156	ZAPOPAN SIN ADICCIONES A.C.

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
157	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CreeSer, A.C.
158	ESPERANZA DE VIDA, CENTRO DE REHABILITACIÓN EN ADICCIONES, A. C.
160	RED DESCUBRE T, A.C.
161	VIVE CASA SHALOM, A.C.
162	RESTRUCTURACIÓN EMOCIONAL, A.C.
163	RED DESCUBRE T, A.C. SUC. ÁLAMO
164	COMUNIDAD TERAPÉUTICA UNDER THE TREE MILLER A.C. VARONIL
165	COMUNIDAD TERAPÉUTICA UNDER THE TREE MILLER A.C. FEMENIL
166	COMUNIDAD TERAPÉUTICA UNDER THE TREE MILLER A.C. VARONIL HDA. LA PIEDRERA
167	COMUNIDAD TERAPÉUTICA MI VIDA ES MEJOR, A.C.
169	EL CAMINO DE LA MISIÓN, A.C.
Sin Código	CAPA AMECA
Sin Código	CAPA DE ARANDAS
Sin Código	CAPA DE AUTLÁN DE NAVARRO
Sin Código	CAPA DE COLOTLÁN
Sin Código	CAPA DE LAGOS DE MORENO
Sin Código	CAPA DE LA HUERTA.
Sin Código	CAPA DE MASCOTA
Sin Código	CAPA DE OCOTLÁN
Sin Código	CAPA DE PUERTO VALLARTA
Sin Código	CAPA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
Sin Código	CAPA DE TAMAZULA

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Código	Centro de Tratamiento fuente de SISVEA 2020
Sin Código	CAPA DE TEPATITLÁN DE MORELOS
Sin Código	CAPA DE TLAJOMULCO
Sin Código	CAPA DE TONALÁ UNIDADES 1 Y 2
Sin Código	CAPA DE ZAPOPAN UNIDADES 1 Y 2
Sin Código	CAPA DE SAN PEDRO TLAQUEAQUE
Sin Código	CAPA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE.
Sin Código	CAPA DE GUADALAJARA
Sin Código	CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL UNIDADES, GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, PUERTO VALLARTA Y UNIDAD DE INTERNAMIENTO.

Indicador:

Puesto Centinela de Urgencias: enfermedades y lesiones de causa externa.

Este indicador se realizó dos veces durante el año, con una periodicidad semestral.

Se aplicó durante una semana tipo. (Semana donde no contenga algún día festivo o puente).

Se incluyeron las Unidades Médicas que cuenten con un servicio urgencias.

La cedula Servicio de Urgencias Hospitalarias: se recaban datos sociodemográficos del paciente, unidad de urgencias donde es atendido, consumo de sustancias y su relación con lesión de causa externa, lugar donde ocurre la lesión, si ingresa por patología de base, consumo regular de alguna sustancia incluyendo alcohol y tabaco, el patrón de consumo durante el último año, edad de que la usó por primera vez, vía de administración, frecuencia de consumo y número de veces.

Se captaron a todos los pacientes que ingresaron a las Unidades de Urgencias entre el rango de edad de 5 años o mayores, conociendo así, la relación existente entre el uso y abuso de sustancias adictivas y las lesiones de causa externa y enfermedades asociadas, captadas en los Centros de Urgencias Médicas de las 13 Regiones Sanitarias.

Indicador Clínicas contra el Tabaquismo.

Este indicador es de tipo permanente

Se aplica a pacientes que acuden a clínica para dejar de fumar.

En la cédula se recaban datos sociodemográficos del paciente.

Lugar donde recibe la atención en el Estado, Jurisdicción y Municipio.

Antecedentes de búsqueda de apoyo

Patrón de consumo de tabaco

Dependencia al tabaco

Consumo de otras sustancias adictivas.

En este año no contamos con pacientes que recibieron atención para dejar de fumar.

Puesto Centinela de Urgencias Hospitalarias

Unidades de Urgencias que participan en SISVEA

Colotlán.

Hospital de Primer Contacto de Colotlán

Hospital de Primer Contacto de Huejuquilla

Lagos de Moreno.

Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno.

Clínica No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social

San Juan de los Lagos.

Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan de los Lagos.

Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos

Tepatitlán de Morelos.

Hospital Sagrado Corazón de Arandas

Tamazula de Gordiano.

Hospital Comunitario de Tamazula

Unidad IMSS No 15

Zapotlán el Grande.

Cruz Roja Mexicana

Hospital Regional Zapotlán el Grande.

Hospital Regional de Zona No. 9 del IMSS

Autlán de Navarro.

Hospital de Primer Contacto la Huerta.

Hospital de Primer Contacto de Casimiro Castillo.

Puerto Vallarta.

Hospital de Primer Contacto Mascota

Cruz Roja Mexicana Vallarta

Hospital Regional de la Secretaria de Salud

Servicios Médicos Municipales

Ameca.

Hospital Regional de Ameca

Cruz Roja de Ameca

Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Delegación Guadalajara.

Cruz Roja Mexicana Unidad Toluquilla.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ruiz Sánchez”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Rivas Souza”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Delgadillo Araujo”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Leonardo Oliva”.

Servicios de Salud del Municipio de Guadalajara “Dr. Ernesto Arias”.

Servicios de Salud de El Salto y Majadas.

Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga.

Servicios Médicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque.

Servicios Médicos Municipales de Tonalá.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Norte.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Sur.

Servicios de Salud de Zapopan Unidad Villas de Guadalupe.

Servicios de Salud de Zapopan, Unidad Federalismo.

Indicador: Consejos Tutelares para Menores y Centros Penitenciarios

Este indicador se reactiva a partir del año 2019, puesto que por la ley de protección al menor no puede estar recluso y tiene el derecho de ser reincorporado a su domicilio, por lo que se había dejado de reportar este indicador en el SISVEA.

Este indicador tiene el objetivo de conocer el consumo de sustancias adictivas en la población con mayor vulnerabilidad como los menores y adultos en conflicto con la ley y ofrece la información siguiente:

Datos sociodemográficos: Fecha de nacimiento, edad, sexo, si hay embarazo, estado y municipio de residencia, nombre, ocupación principal, grado máximo de estudios y su estado civil.

Antecedentes de Ingreso: Número de ingresos, motivo del ingreso, si cometió el delito o infracción bajo el efecto de droga o para conseguir droga.

Patrón de consumo: de forma cronológica la droga de inicio hasta la décima droga preguntando tipo y vías de administración.

Conductas de Riesgo: Consumo de drogas inyectadas y si comparte jeringa o la usa nueva, la conducción de algún vehículo de motor bajo el efecto de alguna droga, si combina sustancias y si se ha presentado problemas de salud secundario al uso.

Disponibilidad de sustancias y/o drogas: En qué lugar consigue y consume con mayor frecuencia las sustancias.

Instituciones que colaboran en el Indicador:

Centro de Observación y Clasificación de Menores Infractores del Estado de Jalisco.

Módulo de tratamiento para las adicciones, comisaría de Prisión Preventiva A. C.

CAIJE Comunidad juvenil terapéutica Libertad y Sentido.

Comisaría General de Prevención y Reinserción Social.

En el presente año por la pandemia el equipo técnico de los Centros Penitenciarios fue necesario no abrir grupo de tratamiento por lo que no contamos con información.

Indicador “Forense”

Servicio Médico Forense.

El proceso de la información se captura y analiza utilizando el Programa del SISVEA, el cual nos permite la impresión de tablas y con el programa de Excel para obtener frecuencias y hacer el cruce de una o más variables.

Indicador: Mortalidad en individuos usuarios de drogas.

La información se obtuvo de los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la ciudad de Guadalajara.

La muestra para el proceso del tamiz toxicológico se obtuvo por el médico forense y fue procesado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Se captaron todos los cadáveres que al momento de fallecer tuvieran como edad mínima 5 años de edad, independientemente de la causa de muerte y que presentaron algún nivel de sustancias adictivas en fluidos corporales. Se buscan niveles de alcohol, cocaína, anfetaminas, cannabinoides, opio y derivados, solventes volátiles y tranquilizantes.

La información se recabó por personal del Secretariado Técnico del CECAJ, en forma semanal.

INDICADOR: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Durante el año 2019 se registraron un total de 7071 pacientes atendidos por establecimientos especializados en adicciones que se encuentran en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2-1999, quienes son asesorados y guiados para dicho cumplimiento.

Los datos referidos en este documento representan a pacientes con problema de consumo con el alcohol, tabaco y otras drogas, que acuden a recibir tratamiento y no representa a la población general.

Perfil Sociodemográfico

Información sobre el estado y municipio de residencia, la edad, sexo, embarazo, actividad principal que desempeña, estado civil, escolaridad en su grado máximo de estudios y centro de tratamiento en el cual se ingresa.

En antecedentes de búsqueda de apoyo

Se pregunta el número de tratamientos que ha recibido durante los últimos 12 meses y durante toda su vida, así como la forma en que acude al tratamiento si es de manera voluntaria, por indicación médica no psiquiátrica y por indicación psiquiátrica, por amigos o familiares, por indicación legal, por indicación de la escuela o trabajo y otros motivos.

Patrón de Consumo

Se busca saber la droga de inicio y droga de impacto, así como su historial del consumo de drogas durante toda su vida, así como el consumo durante el último año, edad en que la usó por primera vez, formas y vías de administración de la droga, forma de consumo actual.

La droga de impacto

Es la sustancia por la que el paciente acude a solicitar o a recibir tratamiento, buscando además edad de inicio, vía de administración, entidad y municipio de consumo.

Conductas de Riesgo

Sobre el consumo de drogas por vía parenteral, el riesgo de compartir jeringas para el uso de éstas, así como el uso de jeringa nueva durante último consumo, la combinación de sustancias adictivas, conducción de algún vehículo de motor bajo el influjo de alcohol o drogas y padecimientos médicos relacionados con el uso de drogas.

Disponibilidad de sustancias o drogas preguntamos los lugares que con mayor frecuencia consigue las sustancias adictivas como en su propia casa, se la llevan a su casa, en casa de algún amigo o familiar, en la calle, en antros y bares, en fiestas y reuniones, en la escuela, en el trabajo, en tiendas cercanas a su domicilio, en parques, picaderos y otros sitios.

Lugares donde acostumbra a consumir la droga de impacto como en su propia casa, en casa de algún amigo o familiar, en la vía pública (calles, parques, etc.), en antros/bares, en fiestas o reuniones, en la escuela, en el trabajo, en picaderos y en pocos casos el que no sepa o no pueda responder.

Evaluación de la dependencia a la droga de impacto, en la cual se evalúan durante los últimos 12 meses de consumo con los siguientes criterios diagnósticos, tolerancia, compulsión, control de consumo, abstinencia, reducción progresiva y uso persistente con los siguientes ítems:

Tolerancia

- Uso de mayor cantidad de droga para lograr el efecto deseado.
- Menor efecto con la misma dosis que antes.
- Si se dio cuenta que necesita mayor cantidad de droga para sentir el mismo efecto.

Consumo compulsivo

- Deseo fuerte de consumir la droga y no puede evitar hacerlo.
- Deseo fuerte de consumo que no puede pensar en otra cosa.

Dificultad para controlar el consumo

- Quiere o ha intentado dejar de consumir o disminuir la cantidad y si ha logrado hacerlo por lo menos durante un mes.
- Periodos en que usó la droga en mayor cantidad y tiempo de lo que se proponía y se le hizo difícil suspender el consumo antes de estar intoxicado

Abstinencia

- Horas o días siguientes de suspender o reducir el consumo se presentaron síntomas abstinencia.
- Uso de otras sustancias para reducir o curar los síntomas de abstinencia.

Reducción Progresiva

- Ha habido ocasiones que dedica mucho tiempo en conseguir la droga.
- Ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de la droga.
- Reducción de actividades importantes sea sociales, familiares o compromisos por el uso de drogas.

Uso Persistente

- Ha tenido problemas de salud como sobredosis accidental, tos persistente, convulsiones, infecciones como hepatitis, SIDA, problemas cardiacos relacionados con el consumo de drogas.
- Continuación el uso a pesar de presentar estos problemas de salud.
- Ha tenido problema psicológicos o sociales asociados al consumo de drogas como depresión, paranoia, fracasos laborales o escolares, conflictos familiares, actos de violencia y accidentes.
- Continúa consumiendo a pesar de los problemas antes descritos.

Los resultados se presentan en Tablas, con números y porcentajes con información general y por Región Sanitaria, en tablas con datos generales y distribuidos por Región Sanitaria y se presentarán separados por sexo.

El personal del SISVEA y de los Centros de Atención Primaria de Adicciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Distribución de Municipios en el Interior de las Regiones Sanitarias.

Región Sanitaria I de Colotlán: (RS-I)

Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mexquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

Región Sanitaria II de Lagos de Moreno: (RS-II)

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Región Sanitaria III de Tepatitlán:(RS-III)

Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo.

Región Sanitaria IV La Barca: (RS-IV)

Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán y Zapotlán del Rey.

Región Sanitaria V Tamazula: (RS-V)

Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán y Valle de Juárez.

Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán: (RS-VI)

Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxcueca, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y Zapotlán de Vadillo.

Región Sanitaria VII de Autlán: (RS-VII)

Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y Unión de Tula.

Región Sanitaria VIII Puerto Vallarta: (RS-VIII)

Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán.

Región Sanitaria IX Ameca: (RS-IX)

Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, el Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán.

Región Sanitaria X Zapopan: (RS-X)

San Cristóbal de la Barranca y Zapopan.

Región Sanitaria XI Tonalá: (RS-XI)

Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, el Salto, Tonalá y Zapotlanejo.

Región Sanitaria XII San Pedro Tlaquepaque: (RS-XII)

Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Villa Corona.

Región Sanitaria XIII Guadalajara: (RS-XIII)

Guadalajara

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 1 NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL ESTADO DE JALISCO SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO			
Región Sanitaria	General	Masculino	Femenino
RS-I Colotlán	16	14	2
RS-II Lagos de Moreno	60	40	20
RS-III Tepatlán	678	556	122
RS-IV La Barca	1147	991	156
RS-V Tamazula	19	17	2
RS-VI Zapotlán el Grande	183	175	8
RS-VII Autlán de Navarro	100	78	22
RS-VIII Puerto Vallarta	87	56	31
RS-IX Ameca	177	149	28
RS-X Zapopan	1136	1062	74
RS-XI Tonalá	218	189	29
RS-XII San Pedro Tlaquepaque	1607	1409	198
RS-XIII Guadalajara	1642	1337	305
Total	7070	6073	997

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 2 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN ANONIMATO SEGÚN REGIÓN SANITARIA**

Anónimo	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Si	25.4%	0.0%	0.0%	0.4%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	28.7%	0.0%	7.8%	0.5%	70.4%	30.4%
No	74.6%	100.0%	100.0%	99.6%	96.1%	100%	100%	100%	71.3%	100%	92.2%	99.5%	29.6%	69.6%

**Cuadro No. 3 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN REGIÓN SANITARIA Y GÉNERO**

	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Masculino	85.9%	87.5%	66.7%	82.0%	86.4%	89.5%	95.6%	78.0%	64.4%	84.2%	93.5%	86.7%	87.7%	81.4%
Femenino	14.1%	12.5%	33.3%	18.0%	13.6%	10.5%	4.4%	22.0%	35.6%	15.8%	6.5%	13.3%	12.3%	18.6%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 4 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN GRUPO DE EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO POR REGIÓN SANITARIA

	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
5 a 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 a 14	2.5%	0.0%	11.7%	5.2%	0.3%	5.3%	1.6%	5.0%	29.9%	4.0%	0.9%	5.5%	2.6%	1.5%
15 a 19	15.8%	37.5%	18.3%	11.4%	9.9%	21.1%	20.8%	26.0%	19.5%	20.3%	13.9%	20.6%	18.0%	18.1%
20 a 24	21.5%	18.8%	16.7%	16.5%	24.7%	15.8%	19.7%	17.0%	9.2%	19.2%	20.2%	21.6%	24.6%	21.0%
25 a 29	17.2%	25.0%	18.3%	17.6%	21.4%	15.8%	14.2%	15.0%	8.0%	14.1%	17.3%	14.7%	17.4%	15.5%
30 a 34	12.6%	0.0%	6.7%	12.5%	16.2%	10.5%	13.1%	10.0%	6.9%	12.4%	11.7%	10.6%	12.1%	12.3%
35 a 39	9.8%	18.8%	15.0%	12.2%	10.4%	15.8%	10.4%	11.0%	12.6%	7.9%	9.9%	9.2%	8.4%	9.5%
40 a 44	7.5%	0.0%	11.7%	9.3%	7.2%	10.5%	8.7%	6.0%	3.4%	11.3%	8.1%	4.1%	7.3%	6.8%
45 a 49	4.9%	0.0%	0.0%	6.0%	4.4%	5.3%	4.9%	5.0%	5.7%	4.0%	6.4%	4.6%	3.5%	5.3%
50 a 54	3.6%	0.0%	0.0%	4.1%	2.4%	0.0%	3.3%	4.0%	1.1%	4.0%	4.7%	6.0%	2.7%	4.4%
55 a 59	2.5%	0.0%	1.7%	3.4%	1.8%	0.0%	2.2%	1.0%	0.0%	2.8%	3.5%	0.0%	2.0%	3.1%
60 a 64	1.1%	0.0%	0.0%	1.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	1.7%	1.8%	0.8%	1.4%
65 a >	0.9%	0.0%	0.0%	0.6%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.4%	0.7%	1.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 5.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Aguascalientes	0	0	0	0	4	0	1	0	0	3	0	0	1	1
Baja California	7	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	1
Baja California Sur	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	22	0	0	0	5	0	5	0	0	0	4	2	3	3
Chiapas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	7	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	1
Ciudad de México	16	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0	4	3
Durango	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Guanajuato	34	0	0	4	16	0	0	0	0	1	5	1	5	2
Guerrero	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0
Hidalgo	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jalisco	6,701	16	60	659	992	19	167	97	86	154	1084	202	1567	1598
México	9	0	0	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
Michoacán	142	0	0	8	91	0	6	1	0	4	8	5	11	8
Morelos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	22	0	0	0	5	0	0	0	1	5	3	3	0	5
Nuevo León	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Oaxaca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Querétaro	5	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Quintana Roo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Sinaloa	10	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	0	0	3
Sonora	7	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 5.2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Tabasco	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tlaxcala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Veracruz	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Yucatán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Zacatecas	28	0	0	0	8	0	0	0	0	3	6	1	2	8
Otro País	18	0	0	1	2	0	1	0	0	0	11	0	0	3

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 6.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA														
Municipio de Residencia	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Acatic	37	0	0	8	15	0	0	0	0	0	2	1	10	1
Acatlán de Juárez	15	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	8	2
Ahualulco del Mercado	16	0	0	0	0	0	1	0	0	10	4	0	0	1
Amacueca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0
Ameca	78	0	0	0	1	0	3	0	0	56	1	0	8	9
San Juanito de Escobedo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Arandas	142	0	0	99	35	0	0	0	0	1	0	0	2	5
Arenal	9	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3
Atemajac de Brizuela	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Atengo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atoyac	50	0	0	13	30	0	0	0	0	1	1	0	1	4
Autlán de Navarro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayotlán	77	0	0	0	1	0	4	69	0	0	1	0	1	1
Ayutla	22	0	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Barca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Bolaños	78	0	0	1	74	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Cabo Corrientes	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Zapotlán El Grande	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cocula	103	0	0	0	3	0	94	0	0	0	2	0	1	3
Colotlán	13	0	0	0	7	0	0	1	0	2	0	0	0	3
Concepción de Buenos Aires	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 6.2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

Municipio de Residencia	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Cuautitlán de García Barragán	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	207	0	0	0	155	0	0	0	0	0	5	0	40	7
Chimaltitlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	11	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	1	3
Grullo	7	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0
Guachinango	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	1,652	0	0	19	53	0	4	0	0	31	141	23	420	961
Hostotipaquillo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Huejúcar	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huerta	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Ixtlahuacán de los M.	36	0	0	1	8	0	0	0	0	1	1	1	17	7
Ixtlahuacán del Río	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalostotitlán	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	35	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Jesús María	23	0	0	9	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Jilotlán de los Dolores	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jocotepec	35	0	0	0	21	0	0	0	0	0	2	0	11	1

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 6.3 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

Municipio de Residencia	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Juanacatlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Juchitlán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lagos de Moreno	41	0	28	10	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Limón	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Magdalena	10	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2
Santa María del Oro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	27	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	1	0
Mazamitla	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Mexicacán	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mixtlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocotlán	302	0	0	3	290	0	0	0	0	0	1	0	8	0
Ojuelos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pihuamo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	63	0	0	1	58	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Puerto Vallarta	34	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	1	2	5
Villa Purificación	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Quitupan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Salto	107	0	0	2	8	0	0	0	0	0	4	8	49	36
San Diego de Alejandría	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	63	0	26	23	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1
San Julián	10	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Martín de Hidalgo	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 6.4 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

Municipio de Residencia	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
San Miguel el Alto	13	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gómez Farías	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2
San Sebastián del Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa María de los Ángeles	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sayula	19	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	3	2
Tala	15	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	1	5
Talpa de Allende	38	0	0	0	0	0	0	0	36	1	0	0	1	0
Tamazula de Gordiano	28	0	0	0	0	19	6	0	0	1	2	0	0	0
Tapalpa	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tecalitlán	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tenamaxtlán	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Teocaltiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	437	0	0	378	39	0	0	0	0	0	4	0	3	13
Tequila	10	0	0	1	2	0	0	0	0	4	0	0	3	0
Teuchitlán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Tizapán el Alto	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Tlajomulco de Zúñiga	349	0	0	5	3	0	0	0	0	1	23	2	204	111
Tlaquepaque	673	0	0	4	6	0	0	0	0	2	22	16	477	146
Tolimán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tonalá	324	0	0	2	6	0	0	0	0	2	17	81	118	98

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 6.5 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA														
Municipio de Residencia	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Tonaya	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totatiche	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tototlán	31	0	0	1	27	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Tuxcacuesco	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tuxpan	10	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0
Unión de San Antonio	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	8	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Villa Corona	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Villa Guerrero	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Villa Hidalgo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yahualica de González Gallo	16	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Zapopan	1,137	0	0	4	16	0	1	0	0	4	830	7	143	132
Zapotiltic	11	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	1	1
Zapotitlán de Vadillo	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	12	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Zapotlanejo	27	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	3	5	4
San Ignacio Cerro Gordo	12	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Municipios de Otros Estados	369	0	0	19	155	0	16	3	1	23	52	16	40	44

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.1 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y REGIÓN SANITARIA														
Ocupación principal	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Estudiante tiempo completo	6.7%	12.5%	25.0%	4.9%	1.6%	5.3%	12.6%	24.0%	27.6%	6.8%	7.7%	9.2%	6.7%	6.4%
Estudiante con actividad laboral	3.4%	6.3%	3.3%	2.9%	1.3%	0.0%	4.4%	3.0%	16.1%	7.3%	4.0%	7.3%	3.4%	3.0%
Tiene empleo estable > 6 meses	39.2%	31.3%	36.7%	50.7%	43.9%	73.7%	55.2%	30.0%	24.1%	50.3%	42.8%	33.0%	34.2%	32.8%
Tiene menos de 6 meses	13.4%	31.3%	18.3%	8.6%	10.0%	15.8%	9.8%	23.0%	11.5%	10.7%	15.0%	7.3%	16.6%	14.4%
Desempleado (busca empleo)	18.6%	6.3%	8.3%	17.3%	7.8%	0.0%	7.1%	6.0%	14.9%	10.7%	16.1%	28.0%	24.7%	25.1%
Desocupado (no busca empleo)	12.5%	12.5%	0.0%	8.7%	26.2%	0.0%	8.7%	8.0%	4.6%	6.2%	10.1%	8.3%	11.2%	10.3%
Hogar	4.9%	0.0%	8.3%	5.8%	9.0%	5.3%	0.5%	6.0%	1.1%	6.2%	2.3%	3.2%	2.6%	6.3%
Pensionado	1.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.6%	1.8%	1.8%	0.6%	1.4%
No aplica	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%
Otra	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.8%	0.0%	0.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 8.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS Y REGIÓN SANITARIA**

Grado de estudios	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Primaria	24.9%	12.5%	20.0%	34.5%	32.0%	36.8%	18.0%	16.0%	5.7%	22.6%	19.5%	24.8%	25.1%	22.4%
Secundaria	43.2%	43.8%	40.0%	40.0%	39.2%	47.4%	37.7%	44.0%	56.3%	42.9%	38.2%	52.3%	47.2%	45.4%
Escolaridad Técnica	3.5%	0.0%	3.3%	2.9%	2.5%	0.0%	1.6%	0.0%	4.6%	2.8%	4.9%	2.3%	4.6%	2.9%
Bachillerato	19.9%	37.5%	21.7%	15.6%	17.6%	15.8%	32.2%	32.0%	19.5%	22.0%	24.9%	13.3%	17.1%	20.9%
Licenciatura	5.6%	6.3%	8.3%	4.3%	4.2%	0.0%	5.5%	5.0%	12.6%	7.3%	10.7%	2.8%	3.0%	5.9%
Maestría														
Doctorado	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	0.4%	0.2%
Especialidad														
No sabe leer ni escribir	1.3%	0.0%	3.3%	1.9%	2.5%	0.0%	1.6%	2.0%	0.0%	0.6%	0.6%	2.3%	1.1%	0.8%
Sabe leer y escribir	1.1%	0.0%	3.3%	0.6%	0.7%	0.0%	1.6%	1.0%	1.1%	1.1%	0.4%	2.3%	1.3%	1.5%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 9 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO CIVIL Y REGIÓN SANITARIA														
	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado Civil	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Soltero	55.6%	56.3%	53.3%	47.8%	54.1%	36.8%	54.1%	55.0%	75.9%	58.2%	54.8%	65.1%	58.4%	55.5%
Casado	18.3%	0.0%	28.3%	25.2%	23.0%	15.8%	19.7%	12.0%	12.6%	10.7%	18.7%	12.8%	15.4%	16.7%
Unión Libre	15.6%	31.3%	8.3%	14.3%	13.6%	42.1%	18.0%	22.0%	6.9%	18.6%	14.3%	14.7%	17.5%	16.1%
Separado	7.4%	12.5%	8.3%	9.1%	5.4%	5.3%	3.8%	8.0%	0.0%	11.3%	8.2%	5.5%	6.7%	8.7%
Divorciado	2.4%	0.0%	0.0%	3.1%	2.8%	0.0%	3.8%	3.0%	4.6%	0.6%	3.2%	1.8%	1.4%	2.3%
Viudo	0.6%	0.0%	1.7%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.8%	0.0%	0.6%	0.7%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 10 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS

SEGÚN ANTECEDENTE DE TRATAMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO Y REGIÓN SANITARIA

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Búsqueda de Apoyo	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Primera vez en el año	86.1%	100%	88.3%	91.6%	91.0%	100%	90.7%	98.0%	92.0%	93.8%	82.7%	85.8%	80.6%	85.4%
Ya había acudido en este año	13.9%	0.0%	11.7%	8.4%	9.0%	0.0%	9.3%	2.0%	8.0%	6.2%	17.3%	14.2%	19.4%	14.6%

Cuadro No. 11 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS

SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE HA RECIBIDO TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número de veces	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Primera Vez	58.6%	56.3%	73.3%	52.7%	47.4%	100.0%	62.3%	71.0%	77.0%	74.6%	50.4%	70.2%	65.2%	61.5%
De 2 a 4	34.6%	43.8%	25.0%	38.8%	48.1%	0.0%	30.6%	21.0%	21.8%	23.7%	39.1%	23.9%	29.6%	30.5%
De 5 a >	6.8%	0.0%	1.7%	8.6%	4.4%	0.0%	7.1%	8.0%	1.1%	1.7%	10.5%	6.0%	5.2%	8.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 12 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN FORMA EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Forma que acude al centro	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Voluntariamente	52.4%	50.0%	70.0%	58.0%	54.5%	73.7%	59.0%	81.0%	54.0%	56.5%	63.6%	41.3%	42.3%	48.2%
Indicación médica no psiquiátrica	5.8%	12.5%	6.7%	4.3%	17.8%	0.0%	2.2%	1.0%	3.4%	0.0%	1.3%	5.0%	0.9%	7.6%
Indicación médica psiquiátrica	1.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	2.8%	1.7%	0.0%	0.6%	1.7%
Lo llevaron amigos o familiares	36.0%	6.3%	16.7%	32.4%	25.8%	21.1%	35.0%	1.0%	2.3%	19.8%	31.6%	43.1%	53.2%	37.0%
Indicación Legal	1.2%	18.8%	6.7%	0.4%	0.9%	0.0%	0.5%	0.0%	3.4%	1.7%	0.9%	1.4%	0.9%	1.8%
Escuela o trabajo	3.6%	6.3%	0.0%	4.9%	1.0%	5.3%	0.5%	17.0%	36.8%	19.2%	1.0%	9.2%	2.0%	3.7%
Otra (s)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 13 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE INICIO Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Total	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Alcohol	34.5%	62.5%	55.0%	45.7%	28.6%	47.4%	31.7%	68.0%	63.2%	44.1%	38.8%	32.1%	31.4%	29.0%
Marihuana	15.0%	12.5%	3.3%	9.4%	17.9%	15.8%	12.6%	8.0%	8.0%	14.7%	15.4%	17.0%	17.2%	14.2%
Inhalantes	2.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	3.9%	1.8%	1.9%	2.7%
Alucinógenos	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%
Heroína	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
Opio/Morfina	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Cocaína	2.1%	0.0%	3.3%	0.9%	1.6%	0.0%	4.4%	1.0%	0.0%	4.5%	2.7%	2.8%	2.6%	1.8%
Tranquilizantes	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.8%	0.0%	0.2%	0.4%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.1%	0.0%	1.7%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	38.3%	25.0%	30.0%	38.6%	29.4%	36.8%	38.8%	22.0%	26.4%	32.8%	32.7%	43.1%	41.3%	47.1%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
Pasta Base	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
Metanfetamina / Cristal	7.2%	0.0%	5.0%	3.8%	21.0%	0.0%	9.3%	1.0%	2.3%	1.7%	4.8%	2.3%	5.1%	4.3%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 14 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
5 a 9	6.7%	6.3%	3.3%	8.6%	4.8%	21.1%	8.2%	4.0%	11.5%	8.5%	5.3%	11.0%	7.8%	6.2%
10 a 14	46.9%	75.0%	53.3%	46.3%	35.1%	42.1%	43.2%	46.0%	63.2%	52.0%	45.2%	56.0%	50.5%	50.6%
15 a 19	37.0%	18.8%	33.3%	39.1%	38.5%	36.8%	39.3%	45.0%	18.4%	35.0%	40.9%	30.3%	34.5%	36.3%
20 a 24	5.5%	0.0%	5.0%	3.8%	14.6%	0.0%	3.3%	1.0%	3.4%	2.3%	4.7%	2.3%	3.5%	3.9%
25 a 29	1.9%	0.0%	3.3%	1.3%	3.5%	0.0%	4.9%	2.0%	3.4%	1.1%	1.4%	0.0%	1.5%	1.8%
30 a 34	1.1%	0.0%	1.7%	0.1%	2.6%	0.0%	1.1%	1.0%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	1.1%	0.5%
35 a 39	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.6%	0.2%
40 a 44	0.2%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.5%	0.1%	0.2%
45 a 49	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%
50 a 54	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%
55 a 59	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
60 a 64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 a >	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 15 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA														
	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Drogas de impacto	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Alcohol	19.3%	25.0%	31.7%	34.4%	16.5%	5.3%	16.4%	41.0%	52.9%	18.6%	20.5%	27.5%	13.6%	15.5%
Marihuana	11.9%	25.0%	16.7%	9.6%	10.4%	10.5%	12.6%	11.0%	16.1%	14.1%	14.4%	14.7%	11.6%	11.1%
Inhalantes	0.9%	0.0%	0.0%	0.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	1.2%	1.4%	1.0%	1.0%
Alucinógenos	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	1.2%
Heroína	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.2%	0.2%
Opio/Morfina	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%
Cocaína	2.5%	0.0%	0.0%	1.5%	2.4%	0.0%	5.5%	0.0%	0.0%	1.7%	3.4%	1.4%	2.1%	3.2%
Tranquilizantes	1.3%	0.0%	0.0%	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.4%	0.5%	1.3%	1.6%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.3%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.5%	0.9%	0.1%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	3.3%	0.0%	3.3%	1.6%	0.7%	0.0%	4.4%	3.0%	3.4%	3.4%	3.3%	4.1%	2.2%	6.5%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
Pasta Base	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.5%	0.1%	0.4%
Metanfetamina/ Cristal	58.7%	50.0%	46.7%	51.0%	66.7%	84.2%	50.3%	45.0%	27.6%	58.2%	53.4%	48.2%	66.0%	57.7%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	9.3%	0.0%	0.0%	2.3%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 16.1 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

Estado	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Aguascalientes	10	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	1	1	1
Baja California Norte	8	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	1
Baja California Sur	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	23	0	0	0	5	0	6	0	0	0	4	1	4	3
Chiapas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chihuahua	6	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1
Ciudad de México	18	0	0	2	1	0	1	0	0	2	4	0	5	3
Durango	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Guanajuato	34	0	0	4	16	0	0	0	0	1	5	1	5	2
Guerrero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Hidalgo	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Jalisco	6,693	16	60	658	987	19	170	99	85	155	1079	205	1562	1598
México	9	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	0
Michoacán	145	0	0	8	94	0	4	1	0	2	12	4	11	9
Morelos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	22	0	0	0	6	0	0	0	1	6	4	2	0	3
Nuevo León	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Oaxaca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Querétaro	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Quintana Roo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Sinaloa	11	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0	0	3
Sonora	7	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 16.2 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN ESTADO DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Tabasco	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tlaxcala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Veracruz	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Yucatán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Zacatecas	30	0	0	0	9	0	0	0	0	3	6	1	2	9
Otro País	20	0	0	1	2	0	1	0	0	0	12	0	1	3

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.1 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Acatic	35	0	0	9	15	0	0	0	0	0	0	0	10	1
Acatlán de Juárez	18	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	9	2
Ahualulco del Mercado	14	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	0	0	1
Amacueca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0
Ameca	85	0	0	0	1	0	3	0	0	63	2	0	7	9
San Juanito de Escobedo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Arandas	139	0	0	94	36	0	0	0	0	1	0	0	3	5
Arenal	9	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3
Atemajac de Brizuela	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Atengo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	55	0	0	15	31	0	0	0	0	1	1	0	1	6
Atoyac	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Autlán de Navarro	77	0	0	0	2	0	4	69	0	0	1	0	1	0
Ayotlán	22	0	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ayutla	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
Barca	78	0	0	1	74	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Bolaños	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Zapotlán El Grande	113	0	0	0	3	0	103	0	0	0	2	0	2	3
Cocula	17	0	0	0	10	0	0	1	0	2	0	1	0	3

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.2 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Colotlán	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Concepción de Buenos Aires	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautitlán de García Barragán	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	144	0	0	0	96	0	0	0	0	0	5	0	37	6
Chimaltitlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	3
Grullo	7	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	1
Guachinango	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	1,680	0	0	17	55	0	4	0	0	31	147	16	418	992
Hostotipaquillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejúcar	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huerta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	43	0	0	1	14	0	0	0	0	1	1	1	18	7
Ixtlahuacán del Río	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Jalostotitlán	9	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	36	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Jesús María	23	0	0	9	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.3 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Jilotlán de los Dolores	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jocotepec	52	0	0	0	39	0	0	0	0	0	1	0	11	1
Juanacatlán	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Juchitlán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lagos de Moreno	41	0	28	10	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
El Limón	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Magdalena	10	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2
Santa María del Oro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	1	0
Mazamitla	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Mexxicacán	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mixtlán	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Ocotlán	303	0	0	3	292	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Ojuelos de Jalisco	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pihuamo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	66	0	0	1	61	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Puerto Vallarta	33	0	0	0	0	0	0	0	22	0	1	1	2	7
Villa Purificación	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Quitupan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salto	100	0	0	2	11	0	0	0	0	0	3	6	43	35
San Cristóbal de la Barranca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.4 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
San Juan de los Lagos	64	0	26	24	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1
San Julián	9	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Martín de Hidalgo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2
San Miguel el Alto	13	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gómez Farías	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
San Sebastián del Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Santa María de los Ángeles	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sayula	18	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	3	1
Tala	16	0	0	3	2	0	0	0	0	5	0	0	1	5
Talpa de Allende	39	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	1	0
Tamazula de Gordiano	26	0	0	0	0	19	4	0	0	1	2	0	0	0
Tapalpa	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tecalitlán	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tenamaxtlán	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Teocaltiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	444	0	0	381	41	0	0	0	0	0	5	0	4	13
Tequila	8	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0
Teuchitlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tizapán el Alto	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.5 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Tlajomulco de Zúñiga	323	0	0	5	3	0	0	0	0	1	23	4	177	110
Tlaquepaque	650	0	0	4	7	0	0	0	0	2	20	13	476	128
Tolimán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Tonalá	373	0	0	2	6	0	0	0	0	2	14	141	113	95
Tonaya	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Totatiche	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tototlán	30	0	0	1	26	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Tuxcacuesco	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxpan	9	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0
Unión de San Antonio	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	8	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Villa Corona	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Villa Guerrero	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yahualica de González Gallo	15	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	1
Zapopan	1,120	0	0	4	18	0	3	0	0	4	827	6	134	124

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 17.6 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO Y REGIÓN SANITARIA**

	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Zapotiltic	10	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	1
Zapotitlán de Vadillo	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	12	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zapotlanejo	24	0	0	4	9	0	0	0	0	0	1	2	4	4
San Ignacio Cerro Gordo	12	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipios de Otros Estados	377	0	0	20	160	0	13	1	2	22	57	13	45	44

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 18 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN USO DE DROGAS INYECTADAS GENERAL Y REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Uso de drogas inyectadas	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Si	251	0	2	25	39	0	2	0	2	5	40	12	51	73
No	6,819	16	58	653	1108	19	181	100	85	172	1096	206	1556	1569

Cuadro No. 19 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS QUE COMPARTEN JERINGAS Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Ha compartido jeringas	251	0	2	25	39	0	2	0	2	5	40	12	51	73
Si	79.3%		100%	88.0%	84.6%		100%		100%	60.0%	85.0%	66.7%	68.6%	79.5%
No	20.3%		0.0%	8.0%	15.4%		0.0%		0.0%	40.0%	15.0%	33.3%	31.4%	20.5%

Cuadro No. 20 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS INYECTADAS CON JERINGA SIN USO PREVIO Y REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Uso de jeringa nueva en la última dosis	251	0	2	25	39	0	2	0	2	5	40	12	51	73
Si	31.5%		0.0%	28%	28.2%		50%		0.0%	0.0%	27.5%	41.7%	33.3%	37.0%
No	68.5%		100%	76.0%	71.8%		50%		100%	100%	72.5%	58.3%	64.7%	63.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 21 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS USAN EN FORMA COMBINADA GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Combina Drogas	251	0	2	25	39	0	2	0	2	5	40	12	51	73
Si	31.5%		0.0%	28%	28.2%		50%		0.0%	0.0%	27.5%	41.7%	33.3%	37.0%
No	68.5%		100%	76.0%	71.8%		50%		100%	100%	72.5%	58.3%	64.7%	63.0%

Cuadro No. 22 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE REPORTAN CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTOR BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Conducción bajo efecto de drogas	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Si	45.5%	62.5%	21.7%	70.4%	41.2%	31.6%	57.9%	57.0%	40.2%	60.5%	34.3%	45.4%	45.3%	43.7%
No	54.5%	37.5%	55.0%	28.5%	58.2%	63.2%	42.1%	42.0%	59.8%	39.5%	65.2%	53.7%	54.0%	56.2%

Cuadro No. 23 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PADECER ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Padece alguna enfermedad	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Si	8.6%	37.5%	0.0%	11.8%	1.3%	21.1%	13.1%	6.0%	2.3%	11.3%	9.2%	31.2%	2.9%	14.2%
No	91.4%	62.5%	100%	88.2%	98.7%	78.9%	86.9%	94.0%	97.7%	88.7%	90.8%	68.8%	97.1%	85.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 24 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS														
LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE MAYOR IMPACTO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Lugar	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
En su propia casa	9.8%	12.5%	5.0%	14.0%	4.1%	5.3%	6.0%	21.0%	2.3%	6.8%	9.6%	7.3%	11.1%	12.1%
Se la llevan a su casa	6.7%	0.0%	3.3%	2.7%	4.8%	0.0%	9.3%	3.0%	3.4%	12.4%	11.1%	2.3%	7.3%	6.5%
En casa de un amigo o familiar	8.0%	6.3%	5.0%	6.2%	4.8%	0.0%	2.7%	6.0%	11.5%	13.0%	11.1%	5.5%	10.2%	7.1%
En la calle	39.1%	75.0%	25.0%	42.0%	69.1%	78.9%	51.4%	33.0%	27.6%	28.2%	29.0%	23.9%	31.5%	33.6%
En antros y bares	2.5%	0.0%	3.3%	2.8%	1.9%	0.0%	2.2%	1.0%	6.9%	2.3%	5.9%	1.4%	1.4%	1.8%
En fiestas y reuniones	2.4%	0.0%	1.7%	3.2%	1.6%	0.0%	4.4%	8.0%	12.6%	1.1%	2.3%	10.6%	1.8%	1.3%
En la escuela	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.6%	0.5%	0.0%	0.6%	0.2%
En el trabajo	2.3%	0.0%	1.7%	3.2%	1.0%	10.5%	1.1%	5.0%	0.0%	1.7%	2.6%	2.3%	2.1%	3.0%
En tiendas cercanas a mi casa	18.0%	0.0%	55.0%	19.5%	9.3%	5.3%	10.4%	10.0%	35.6%	29.4%	17.6%	19.3%	18.3%	21.6%
Parques	0.9%	0.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.0%	1.1%	2.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.5%	0.9%	1.1%
Picaderos	9.7%	0.0%	0.0%	5.2%	2.4%	0.0%	10.9%	11.0%	0.0%	4.5%	8.9%	26.6%	14.6%	11.6%
Otro	0.1%	6.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 25 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS														
LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE MAYOR IMPACTO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Donde la consume	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
La tiene en su casa	41.6%	18.8%	51.7%	70.1%	38.6%	15.8%	44.3%	33.0%	32.2%	36.7%	38.6%	30.3%	38.5%	40.0%
En casa de un amigo o familiar	13.0%	0.0%	11.7%	7.1%	9.3%	10.5%	9.3%	12.0%	17.2%	15.3%	14.3%	9.2%	17.2%	13.7%
En la vía pública (calles, parques)	30.1%	75.0%	25.0%	9.1%	43.2%	52.6%	24.6%	31.0%	20.7%	35.0%	27.2%	31.7%	29.7%	31.8%
En antros y bares	3.2%	0.0%	3.3%	2.9%	2.9%	0.0%	3.8%	0.0%	8.0%	2.8%	7.1%	2.3%	1.8%	2.2%
En fiestas y reuniones	3.9%	0.0%	1.7%	4.6%	1.8%	5.3%	7.1%	8.0%	17.2%	2.3%	6.6%	12.8%	2.7%	2.2%
En la escuela	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	1.1%	1.0%	0.0%	1.1%	1.0%	0.0%	0.6%	0.2%
En el trabajo	4.6%	0.0%	5.0%	4.6%	3.1%	15.8%	5.5%	7.0%	4.6%	4.0%	2.2%	5.5%	5.8%	5.6%
En picaderos	2.9%	0.0%	1.7%	0.3%	0.9%	0.0%	4.4%	8.0%	0.0%	2.3%	2.7%	7.8%	3.5%	4.2%
Otro	0.1%	6.3%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 26 PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN DROGAS DE MAYOR CONSUMO EN GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Droga de mayor consumo	7070	16	60	678	1147	19	183	100	87	177	1136	218	1607	1642
Alcohol	72.2%	0.0%	85.0%	87.3%	54.3%	78.9%	68.9%	93.0%	97.7%	85.3%	79.8%	74.3%	68.1%	73.4%
Marihuana	58.9%	93.8%	65.0%	48.5%	51.4%	78.9%	57.4%	61.0%	63.2%	64.4%	61.5%	65.6%	57.2%	65.9%
Inhalantes	13.1%	0.0%	10.0%	6.5%	5.6%	5.3%	5.5%	4.0%	0.0%	10.7%	20.0%	21.6%	10.3%	20.8%
Alucinógenos	5.6%	0.0%	5.0%	3.1%	3.5%	0.0%	4.4%	2.0%	5.7%	7.9%	5.4%	7.8%	2.4%	11.6%
Heroína	1.5%	0.0%	1.7%	2.7%	1.0%	5.3%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	2.4%	0.9%	0.6%	1.9%
Opio/Morfina	0.7%	0.0%	5.0%	0.0%	0.3%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.6%	1.9%	0.0%	0.2%	0.7%
Cocaína	30.9%	50.0%	36.7%	27.9%	21.3%	31.6%	29.0%	33.0%	26.4%	39.0%	44.1%	40.8%	17.9%	40.3%
Tranquilizantes	11.0%	0.0%	10.0%	12.8%	5.9%	0.0%	8.2%	5.0%	1.1%	11.3%	11.6%	12.4%	7.3%	18.3%
Barbitúricos	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%
Anfetaminas	1.6%	0.0%	5.0%	1.9%	0.6%	0.0%	1.6%	0.0%	1.1%	1.7%	1.1%	2.3%	1.7%	2.3%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	65.0%	87.5%	73.3%	74.6%	45.5%	78.9%	65.6%	81.0%	63.2%	70.1%	64.1%	70.2%	64.8%	72.5%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	1.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.9%	1.9%	1.8%
Pasta Base	2.9%	0.0%	0.0%	0.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.6%	8.2%	3.2%	0.7%	4.9%
Metanfetamina/ Cristal	69.6%	87.5%	58.3%	64.7%	76.3%	84.2%	59.0%	62.0%	39.1%	70.1%	66.0%	65.6%	74.1%	68.8%
Flunitracepam	0.3%	0.0%	3.3%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	0.0%	0.6%
Crack	5.1%	0.0%	5.0%	1.0%	3.7%	0.0%	12.6%	0.0%	0.0%	7.3%	7.0%	6.4%	3.4%	7.7%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 27.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,362	4	19	233	189	1	30	41	46	33	233	60	218	255
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	61.4%	75.0%	94.7%	51.1%	96.3%	100%	80.0%	51.2%	39.1%	69.7%	43.8%	55.0%	61.9%	61.6%
Menor efecto que antes	56.7%	75.0%	57.9%	32.6%	96.8%	100%	50.0%	46.3%	45.7%	57.6%	45.5%	56.7%	60.1%	60.0%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	57.3%	75.0%	52.6%	45.9%	96.3%		40.0%	46.3%	41.3%	54.5%	42.1%	51.7%	58.3%	60.8%
COMPULSION														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	57.7%	75.0%	73.7%	67.8%	94.2%	100%	80%	41.5%	34.8%	48.5%	38.6%	50.0%	49.5%	51.4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	42.7%	75.0%	21.1%	23.2%	94.7%		40.0%	41.5%	26.1%	42.4%	29.6%	33.3%	40.4%	43.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 27.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,362	4	19	233	189	1	30	41	46	33	233	60	218	255
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	64.4%	100%	84.2%	72.1%	85.7%	100%	73.3%	53.7%	41.3%	84.8%	46.4%	61.7%	63.8%	59.2%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	56.1%	100%	42.1%	41.2%	94.2%		46.7%	56.1%	37.0%	57.6%	39.9%	48.3%	58.7%	60.8%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	64.1%	75.0%	94.7%	73.4%	95.8%	100%	73.3%	56.1%	41.3%	75.8%	42.5%	51.7%	60.6%	58.0%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	52.7%	75.0%	47.4%	54.1%	94.2%	100%	46.7%	51.2%	30.4%	30.3%	35.2%	30.0%	55.0%	47.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 27.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL ALCOHOL ES LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,362	4	19	233	189	1	30	41	46	33	233	60	218	255
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	35.3%	75.0%	47.4%	17.2%	76.2%		36.7%	51.2%	17.4%	36.4%	20.6%	25.0%	38.1%	34.1%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	51.8%	75.0%	36.8%	51.9%	95.8%	100%	56.7%	53.7%	23.9%	45.5%	28.3%	45.0%	52.8%	46.7%
Descuido de actividades	53.5%	75.0%	57.9%	37.3%	96.3%	100%	46.7%	56.1%	30.4%	45.5%	40.8%	50.0%	55.0%	52.2%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	36.1%	75.0%	42.1%	37.3%	69.8%		40.0%	43.9%	17.4%	45.5%	24.5%	16.7%	31.7%	28.6%
Continuó usando a pesar de esos problemas	42.1%	75.0%	31.6%	37.3%	89.4%		43.3%	46.3%	21.7%	51.5%	26.6%	21.7%	38.5%	35.7%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	63.2%	75.0%	94.7%	70.8%	91.5%		76.7%	58.5%	43.5%	69.7%	43.8%	51.7%	60.1%	58.0%
Continúa usando a pesar de esos problemas	62.6%	75.0%	94.7%	70.8%	91.5%		76.7%	61.0%	39.1%	66.7%	45.5%	50.0%	58.3%	56.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 28 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	1,362	4	19	233	189	1	30	41	46	33	233	60	218	255
5 a 9	4.3%			7.7%	3.7%		3.3%	2.4%	13.0%		2.6%	3.3%	5.0%	2.7%
10 a 14	29.6%	75.0%	26.3%	35.6%	22.2%		36.7%	39.0%	54.3%	39.4%	21.5%	43.3%	29.4%	25.5%
15 a 19	47.5%	25.0%	47.4%	42.5%	40.7%	100%	46.7%	51.2%	19.6%	42.4%	55.8%	46.7%	52.8%	50.6%
20 a 24	10.5%		5.3%	8.2%	22.2%				6.5%	12.1%	11.2%	5.0%	5.0%	13.3%
25 a 29	3.4%		10.5%	3.4%	4.8%		6.7%		6.5%		2.6%		2.8%	3.9%
30 a 34	2.1%		10.5%	0.9%	4.2%			2.4%			3.0%		1.8%	2.0%
35 a 39	1.3%			0.4%	1.1%		3.3%			3.0%	3.0%		1.8%	0.8%
40 a 44	0.4%						3.3%	2.4%				1.7%	0.5%	0.8%
45 a 49	0.5%			0.9%	0.5%			2.4%		3.0%			0.5%	0.4%
50 a 54	0.1%			0.4%							0.4%			
55 a 59														
60 a 64	0.1%				0.5%									
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 29.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	838	4	10	65	119	2	23	11	14	25	164	32	186	183
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	55.1%	100%	30.0%	26.2%	90.8%	100%	65.2%	36.4%	50.0%	60.0%	43.9%	78.1%	42.5%	60.7%
Menor efecto que antes	54.1%	100%	20.0%	21.5%	90.8%	100%	26.1%	27.3%	42.9%	44.0%	48.2%	68.8%	44.6%	61.7%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	53.3%	100%	20.0%	44.6%	90.8%	100%	26.1%	27.3%	35.7%	44.0%	45.1%	71.9%	40.3%	57.4%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	48.1%	100%	20.0%	50.8%	90.8%	100%	69.6%	27.3%	35.7%	52.0%	31.7%	65.6%	31.2%	47.0%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	39.1%	100%	30.0%	21.5%	89.9%	100%	30.4%	27.3%	21.4%	36.0%	25.6%	53.1%	24.7%	38.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 29.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	838	4	10	65	119	2	23	11	14	25	164	32	186	183
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	57.0%	100%	40.0%	67.7%	85.7%	50%	82.6%	63.6%	50.0%	72.0%	43.3%	78.1%	37.1%	58.5%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	49.2%	100%	20.0%	29.2%	87.4%	50%	17.4%	63.6%	35.7%	32.0%	40.2%	62.5%	36.6%	56.8%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	44.7%	100%	30%	43.1%	89.1%	50%	52.2%	27.3%	35.7%	48.0%	34.8%	37.5%	30.1%	41.5%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	40.1%	75%	30%	33.8%	88.2%	50%	30.4%	27.3%	21.4%	36.0%	34.1%	37.5%	29%	31.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 29.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA MARIHUANA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	838	4	10	65	119	2	23	11	14	25	164	32	186	183
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	35.4%	100%	10.0%	12.3%	79%	50%	34.8%		14.3%	32.0%	28.7%	53.1%	26.9%	31.1%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	41.2%	100%	20.0%	33.8%	88.2%	50%	30.4%		14.3%	44.0%	29.3%	53.1%	32.3%	36.1%
Descuido de actividades	47.3%	100%	30.0%	29.2%	90.8%	50%	34.8%		28.6%	48.0%	34.1%	62.5%	33.3%	54.1%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	29.4%	100%	10%	10.8%	82.4%		30.4%		14.3%	32.0%	18.9%	34.4%	15.1%	26.8%
Continuó usando a pesar de esos problemas	33.5%	100%	10%	13.8%	85.7%		30.4%		28.6%	40.0%	23.2%	43.8%	23.1%	26.8%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	54.4%	100%	50%	47.7%	87.4%		87.0%	72.7%	64.3%	68.0%	38.4%	78.1%	37.1%	55.2%
Continúa usando a pesar de esos problemas	55.1%	100%	40%	46.2%	87.4%		82.6%	72.7%	64.3%	72.0%	39.0%	71.9%	39.2%	57.9%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 30 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
MARIHUANA	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	838	4	10	65	119	2	23	11	14	25	164	32	186	183
5 a 9	1.8%			1.5%			8.7%		7.1%	8.0%	3.7%	3.1%		1.1%
10 a 14	42.1%	50%	60%	47.7%	17.6%	100%	34.8%	45.5%	71.4%	28.0%	42.7%	62.5%	46.8%	45.9%
15 a 19	43.8%	50%	40%	43.1%	42.9%		52.2%	36.4%	21.4%	60.0%	42.7%	21.9%	44.6%	48.1%
20 a 24	8.0%			4.6%	24.4%			18.2%		4.0%	6.1%	12.5%	6.5%	3.3%
25 a 29	2.4%			1.5%	6.7%						4.3%		2.2%	
30 a 34	1.2%				5.9%		4.3%				0.6%			0.5%
35 a 39	0.6%			1.5%	1.7%									1.1%
40 a 44	0.1%				0.8%									
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 31.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGION SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	62	-	-	2	10	-	-	-	-	1	14	3	16	16
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	59.7%			50%	100%						21.4%	66.7%	50.0%	81.3%
Menor efecto que antes	61.3%				100%						14.3%	66.7%	56.3%	93.8%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	62.9%			50%	100%						14.3%	66.7%	62.5%	87.5%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	64.5%			100%	100%						21.4%	66.7%	62.5%	81.3%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	59.7%				100%						14.3%	66.7%	62.5%	81.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 31.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGION SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	62	-	-	2	10	-	-	-	-	1	14	3	16	16
DIFICULTAD EN CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	59.7%			100%	100%					100%	21.4%	66.7%	62.5%	56.3%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	58.1%			50%	100%							66.7%	56.3%	87.5%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	61.3%			100%	100%						7.1%	66.7%	68.8%	75%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	54.8%			50%	100%							66.7%	68.8%	62.5%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 31.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LOS INHALANTES SON LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	62	-	-	2	10	-	-	-	-	1	14	3	16	16
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	43.5%				70%						7.1%	66.7%	50.0%	56.3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	54.8%			100%	100%							66.7%	50%	75%
Descuido de actividades	62.9%			50%	100%						14.3%	66.7%	62.5%	87.5%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	53.2%			50%	100%						21.4%	66.7%	43.8%	62.5%
Continuó usando a pesar de esos problemas	53.2%			50%	100%						14.3%	66.7%	50.0%	62.5%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	61.3%			100%	100%						21.4%	66.7%	62.5%	68.8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	54.8%			100%	100%							66.7%	56.3%	68.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	62	-	-	2	10	-	-	-	-	1	14	3	16	16
5 a 9	4.8%			50.0%						100%			6.3%	
10 a 14	38.7%			50.0%	50%						57.1%	66.7%	25.0%	25.0%
15 a 19	38.7%				30%						42.9%		43.8%	50.0%
20 a 24	9.7%				10%								6.3%	25.0%
25 a 29	3.2%				10%								6.3%	
30 a 34														
35 a 39	1.6%												6.3%	
40 a 44														
45 a 49	1.6%											33.3%		
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64	1.6%												6.3%	
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 33.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	179	-	-	10	28	-	10	-	-	3	39	3	33	53
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	70.9%			70%	100%		80%			100%	53.8%	66.7%	60.6%	71.7%
Menor efecto que antes	65.4%			30%	100%		10%			100%	59.0%	100%	60.6%	67.9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	65.4%			40%	100%		10%			100%	51.3%	66.7%	60.6%	73.6%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	65.4%			90%	96.4%		70%			100%	53.8%	66.7%	42.4%	64.2%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	57.5%			50%	100%		10%			100%	43.6%	66.7%	42.4%	62.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 33.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	179	-	-	10	28	-	10	-	-	3	39	3	33	53
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	69.3%			80%	96.4%		90.0%			66.7%	56.4%	100%	63.6%	60.4%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	65.9%			60%	100%		40.0%			100%	61.5%	66.7%	45.5%	67.9%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	68.7%			100%	100%		40%			66.7%	66.7%	66.7%	60.6%	58.5%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	57.5%			60%	100%		20%			100%	43.6%	66.7%	54.5%	50.9%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 33.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA COCAÍNA ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	179	-	-	10	28	-	10	-	-	3	39	3	33	53
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	43%			30.0%	89.3%		50%			100%	23.1%	66.7%	45.5%	28.3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	58.1%			40.0%	100%		40%			100%	46.2%	66.7%	60.6%	47.2%
Descuido de actividades	62.6%			60.0%	100%		20%			100%	51.3%	66.7%	54.5%	62.3%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	47.5%			80%	92.9%		40%			100%	35.9%	66.7%	30.3%	34.0%
Continuó usando a pesar de esos problemas	50.8%			80%	92.9%		20%			100%	41.0%	66.7%	36.4%	41.5%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	67.0%			70%	96.4%		60%			100%	61.5%	100%	60.6%	56.6%
Continúa usando a pesar de esos problemas	64.8%			70%	96.4%		60%			100%	59%	100%	54.5%	54.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 34 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	179	-	-	10	28	-	10	-	-	3	39	3	33	53
5 a 9														
10 a 14	12.3%			10.0%	7.1%		20%			33.3%	12.8%	66.7%	9.1%	11.3%
15 a 19	54.7%			20.0%	42.9%		40%			33.3%	59.0%	33.3%	69.7%	60.4%
20 a 24	16.8%			50.0%	28.6%					33.3%	7.7%		12.1%	17.0%
25 a 29	10.1%			10.0%	17.9%		40%				10.3%		6.1%	3.8%
30 a 34	0.6%													1.9%
35 a 39	4.5%			10.0%	3.6%						5.1%		3.0%	5.7%
40 a 44	0.6%										2.6%			
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64	0.6%										2.6%			
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 35.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	230	-	2	11	8	-	8	3	3	6	38	9	35	107
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	48.7%			54.5%	100%		12.5%	33.3%	33.3%	50.0%	26.3%	55.6%	54.3%	54.2%
Menor efecto que antes	46.5%			27.3%	100%		12.5%	33.3%	33.3%	16.7%	23.7%	66.7%	51.4%	55.1%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	43.9%			27.3%	100%		25%	33.3%	33.3%	16.7%	18.4%	44.4%	48.6%	53.3%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	46.5%		50%	54.5%	87.5%		50%	33.3%	33.3%	50%	23.7%	44.4%	45.7%	51.4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	33.5%		50%	9.1%	87.5%		12.5%	33.3%	33.3%	16.7%	15.8%	11.1%	42.9%	39.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 35.2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	230	-	2	11	8	-	8	3	3	6	38	9	35	107
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	38.3%			9.1%	87.5%		50.0%	33.3%	33.3%	33.3%	10.5%	66.7%	48.6%	42.1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	40.0%			9.1%	87.5%		25%	33.3%	33.3%	33.3%	15.8%	44.4%	31.4%	53.3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	33.0%				75%		50%	33.3%	33.3%	50.0%	21.1%	11.1%	37.1%	36.4%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	26.1%				75%		12.5%	33.3%	33.3%	33.3%	18.4%	11.1%	25.7%	29.9%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 35.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO EL TABACO ES LA DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	230	-	2	11	8	-	8	3	3	6	38	9	35	107
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	21.7%				25%		37.5%	33.3%	33.3%	16.7%	7.9%		22.9%	29.0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	20.0%				75%		12.5%	33.3%	33.3%	16.7%	13.2%		17.1%	23.4%
Descuido de actividades	23.9%				75%		12.5%	33.3%	33.3%	16.7%	13.2%	11.1%	22.9%	29.0%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	26.5%				75%		50%	33.3%	33.3%	33.3%	10.5%	11.1%	22.9%	31.8%
Continuó usando a pesar de esos problemas	27.0%				75%		25%	33.3%	33.3%	33.3%	10.5%	11.1%	28.6%	32.7%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	30%				75%		37.5%	33.3%	100%	50.0%	15.8%	11.1%	25.7%	34.6%
Continúa usando a pesar de esos problemas	30%				75%		37.5%	33.3%	33.3%	50.0%	10.5%	11.1%	28.6%	37.4%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 36 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	230	-	2	11	8	-	8	3	3	6	38	9	35	107
5 a 9	2.6%			9.1%	12.5%								2.9%	2.8%
10 a 14	40.9%		50%	63.6%	12.5%		50%		100%	66.7%	36.8%	22.2%	40.0%	41.1%
15 a 19	43.0%		50%	18.2%	62.5%		50%	66.7%		33.3%	42.1%	66.7%	34.3%	45.8%
20 a 24	7.8%			9.1%	12.5%						7.9%		11.4%	8.4%
25 a 29	3.0%							33.3%			2.6%		8.6%	1.9%
30 a 34	0.9%										5.3%			
35 a 39	0.9%										5.3%			
40 a 44	0.4%											11.1%		
45 a 49														
50 a 54	0.4%												2.9%	
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 37.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	4,147	8	28	346	765	16	92	45	24	103	607	105	1,061	947
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	76.2%	87.5%	78.6%	52.3%	97.1%	93.8%	87.0%	93.3%	83.3%	74.8%	62.1%	86.7%	70.0%	80.3%
Menor efecto que antes	74.2%	87.5%	32.1%	31.8%	96.9%	87.5%	48.9%	91.1%	87.5%	57.3%	66.7%	83.8%	72.0%	81.6%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	72.7%	87.5%	32.1%	41.6%	96.9%	81.3%	46.7%	88.9%	87.5%	54.4%	62.1%	85.7%	68.6%	78.7%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	71.4%	100%	85.7%	82.4%	93.6%	56.3%	89.1%	84.4%	75.0%	64.1%	57.5%	78.1%	59.1%	69.6%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	59.8%	100%	35.7%	22.0%	91.2%	43.8%	46.7%	82.2%	50.0%	39.8%	51.4%	69.5%	49.6%	67.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 37.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	4,147	8	28	346	765	16	92	45	24	103	607	105	1,061	947
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	73.5%	100%	92.9%	85.0%	85.4%	50%	92.4%	82.2%	70.8%	75.7%	64.1%	76.2%	67.2%	69.7%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	67.5%	100%	25.0%	38.2%	90.7%	25%	38.0%	80.0%	87.5%	48.5%	58.3%	71.4%	64.0%	74.3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	78.8%	100%	96.4%	82.1%	96.3%	37.5%	82.6%	84.4%	75.0%	82.5%	66.9%	86.7%	72.9%	75.7%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	68.2%	100%	28.6%	57.8%	94.4%	18.8%	47.8%	86.7%	75.0%	47.6%	57.7%	72.4%	64.0%	66.6%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 37.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LAS METANFETAMINAS SON LA DROGA DE IMPACTO														
GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	4,147	8	28	346	765	16	92	45	24	103	607	105	1,061	947
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	55.8%	100%	60.7%	26.0%	73.3%	12.5%	72.8%	88.9%	50.0%	39.8%	53.0%	51.4%	53.5%	56.0%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	68.9%	100%	32.1%	49.4%	94.4%	43.8%	53.3%	88.9%	66.7%	45.6%	59.3%	72.4%	63.8%	71.4%
Descuido de actividades	75.3%	100%	35.7%	50.3%	96.7%	50.0%	43.5%	88.9%	66.7%	52.4%	64.7%	84.8%	73.5%	81.3%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	48.4%	87.5%	50%	30.9%	77.1%	25.0%	45.7%	64.4%	58.3%	60.2%	41.4%	48.6%	40.5%	42.8%
Continuó usando a pesar de esos problemas	53.8%	75.0%	50%	30.9%	80.5%	18.8%	45.7%	68.9%	62.5%	60.2%	47.3%	64.8%	48.2%	49.6%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	77.6%	100%	92.9%	78.9%	88.5%	68.8%	96.7%	93.3%	79.2%	78.6%	67.2%	94.3%	73.1%	74.8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	77.6%	100%	96.4%	78.0%	88.5%	68.8%	92.4%	93.3%	79.2%	77.7%	67.2%	94.3%	73.0%	76.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 38 EDAD DE INICIO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	4,147	8	28	346	765	16	92	45	24	103	607	105	1,061	947
5 a 9	0.1%				0.1%								0.1%	0.2%
10 a 14	10.2%		3.6%	14.5%	7.3%	25.0%	15.2%	17.8%	8.3%	11.7%	9.9%	7.6%	10.4%	10.5%
15 a 19	42.8%	62.5%	57.1%	41.6%	42.5%	50.0%	34.8%	42.2%	37.5%	36.9%	47.0%	53.3%	44.0%	39.1%
20 a 24	20.9%	12.5%	10.7%	19.7%	31.8%	12.5%	18.5%	13.3%	4.2%	17.5%	18.6%	15.2%	18.4%	19.5%
25 a 29	11.4%		10.7%	13.0%	10.1%	6.3%	20.7%	15.6%	16.7%	17.5%	9.7%	5.7%	11.3%	12.1%
30 a 34	6.5%	25.0%	14.3%	4.3%	5.8%		3.3%	6.7%	8.3%	9.7%	8.1%	6.7%	6.6%	6.2%
35 a 39	3.8%			3.8%	1.3%	6.3%	5.4%	2.2%	16.7%	4.9%	2.5%	3.8%	4.7%	5.3%
40 a 44	2.0%		3.6%	1.4%	0.7%		2.2%	2.2%	8.3%	1.0%	1.6%	3.8%	1.6%	3.5%
45 a 49	1.5%			1.2%	0.4%						1.6%	2.9%	2.5%	1.8%
50 a 54	0.4%			0.6%	0.1%					1.0%	0.3%	1.0%	0.3%	0.7%
55 a 59	0.3%										0.5%			0.8%
60 a 64	0.1%												0.1%	0.2%
65 a >														

SEXO MASCULINO Y POR REGIÓN SANITARIA

Cuadro número 39: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR USO DE DROGAS SEGÚN ANONIMATO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Anónimo	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Si	24.6%	0.0%	0.0%	0.5%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	32.1%	0.0%	6.8%	0.0%	69.2%	28.6%
No	75.4%	100%	100%	99.5%	95.7%	100%	100%	100%	67.9%	100%	93.2%	100%	30.8%	71.4%

Cuadro No. 40: PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR USO DE DROGAS SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGION SANITARIA														
	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad Actual	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
5 a 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 a 14	1.5%	0.0%	15.0%	3.1%	0.2%	5.9%	1.1%	5.1%	25.0%	2.7%	0.8%	3.2%	1.5%	0.7%
15 a 19	14.8%	28.6%	15.0%	11.0%	10.6%	11.8%	18.3%	23.1%	21.4%	16.8%	13.5%	20.1%	17.0%	15.8%
20 a 24	21.5%	21.4%	17.5%	16.4%	23.4%	17.6%	20.6%	15.4%	10.7%	19.5%	20.6%	20.1%	24.3%	21.3%
25 a 29	17.7%	28.6%	10.0%	16.9%	22.2%	17.6%	14.9%	14.1%	8.9%	15.4%	17.5%	16.4%	17.7%	16.2%
30 a 34	13.1%	0.0%	5.0%	13.7%	16.2%	11.8%	13.7%	11.5%	5.4%	14.1%	12.3%	11.6%	12.6%	12.6%
35 a 39	10.1%	21.4%	20.0%	12.9%	10.0%	17.6%	10.3%	12.8%	10.7%	9.4%	9.7%	9.5%	9.1%	10.0%
40 a 44	7.8%	0.0%	15.0%	9.9%	7.5%	11.8%	9.1%	6.4%	3.6%	11.4%	8.0%	3.7%	7.7%	7.2%
45 a 49	5.2%	0.0%	0.0%	6.1%	4.3%	5.9%	5.1%	6.4%	8.9%	4.7%	6.3%	5.3%	3.8%	6.1%
50 a 54	3.6%	0.0%	0.0%	4.5%	2.2%	0.0%	3.4%	5.1%	0.0%	3.4%	4.6%	6.9%	2.8%	4.2%
55 a 59	2.6%	0.0%	2.5%	3.8%	2.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.7%	3.4%	0.0%	2.2%	3.2%
60 a 64	1.1%	0.0%	0.0%	1.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.4%	0.0%	1.6%	1.6%	0.8%	1.4%
65 a >	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.6%	0.6%	1.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 41.I: DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

Estado.	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Aguascalientes	9	0	0	0	3	0	1	0	0	3	0	0	1	1
Baja California	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1
Baja California Sur	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	20	0	0	0	4	0	5	0	0	0	4	2	2	3
Chiapas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	6	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Distrito Federal	14	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0	2	3
Durango	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Guanajuato	31	0	0	3	15	0	0	0	0	1	5	1	4	2
Guerrero	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0
Hidalgo	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jalisco	5,745	14	40	539	857	17	159	75	56	127	1014	173	1377	1297
México	9	0	0	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
Michoacán	124	0	0	7	78	0	6	1	0	4	7	5	10	6
Morelos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	18	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	3	0	5
Nuevo León	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Oaxaca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Querétaro	5	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Quintana Roo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 41.2: DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado.	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Sinaloa	10	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	0	0	3
Sonora	6	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Tabasco	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tlaxcala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Veracruz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yucatán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zacatecas	25	0	0	0	6	0	0	0	0	3	6	1	1	8
Otro País	16	0	0	1	2	0	1	0	0	0	10	0	0	2

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 42.1: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Residencia Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Acatic	32	0	0	6	12	0	0	0	0	0	2	1	10	1
Acatlán de Juárez	14	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8	2
Ahualulco del Mercado	14	0	0	0	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0
Amacueca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0
Ameca	63	0	0	0	1	0	3	0	0	41	1	0	8	9
San Juanito de Escobedo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Arandas	102	0	0	62	33	0	0	0	0	1	0	0	2	4
Arenal	8	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2
Atemajac de Brizuela	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Atengo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	34	0	0	10	22	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Atoyac	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autlán de Navarro	58	0	0	0	1	0	4	52	0	0	0	0	1	0
Ayotlán	20	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ayutla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Barca	68	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Bolaños	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Zapotlán El Grande	96	0	0	0	3	0	87	0	0	0	2	0	1	3
Cocula	10	0	0	0	6	0	0	1	0	2	0	0	0	1
Colotlán	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Concepción de Buenos Aires	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 42.2: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Residencia Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Cuautitlán de García Barragán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	197	0	0	0	147	0	0	0	0	0	4	0	40	6
Chimaltitlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	3
Grullo	7	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0
Guachinango	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	1,427	0	0	17	48	0	4	0	0	25	121	23	388	801
Hostotipaquillo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Huejúcar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huerta	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	32	0	0	1	6	0	0	0	0	1	1	1	17	5
Ixtlahuacán del Río	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalostotitlán	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	29	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Jesús María	16	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Jilotlán de los Dolores	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jocotepec	31	0	0	0	17	0	0	0	0	0	2	0	11	1
Juanacatlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Juchitlán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 42.3: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Residencia Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Lagos de Moreno	28	0	19	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Limón	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Magdalena	10	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2
Santa María del Oro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	21	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	0
Mazamitla	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Mexticacán	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mixtlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocotlán	248	0	0	3	236	0	0	0	0	0	1	0	8	0
Ojuelos de Jalisco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pihuamo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	53	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Puerto Vallarta	27	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	2	5
Villa Purificación	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Quitupan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Salto	85	0	0	2	7	0	0	0	0	0	4	7	40	25
San Cristóbal de la Barranta	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	52	0	17	22	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1
San Julián	10	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Martín de Hidalgo	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2
San Miguel el Alto	9	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 42.4: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
 SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Residencia Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Gómez Farías	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
San Sebastián del Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Santa María de los Ángeles	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sayula	17	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	3	2
Tala	12	0	0	3	2	0	0	0	0	4	0	0	0	3
Talpa de Allende	20	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	1	0
Tamazula de Gordiano	26	0	0	0	0	17	6	0	0	1	2	0	0	0
Tapalpa	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tecalitlán	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tenamaxtlán	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Teocaltiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	383	0	0	332	37	0	0	0	0	0	4	0	0	10
Tequila	9	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	3	0
Teuchitlán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Tizapán el Alto	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Tlajomulco de Zúñiga	287	0	0	5	2	0	0	0	0	0	19	2	174	85
Tlaquepaque	565	0	0	2	5	0	0	0	0	2	20	16	410	110
Tolimán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tonalá	261	0	0	1	5	0	0	0	0	1	14	67	94	79
Tonaya	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totatiche	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 42.5: NÚMERO DE PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y REGIÓN SANITARIA**

	Estatad	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Residencia Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Tototlán	25	0	0	0	22	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Tuxcacuesco	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tuxpan	9	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0
Unión de San Antonio	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	8	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Villa Corona	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Villa Guerrero	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Villa Hidalgo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yahualica de González Gallo	15	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	5	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Zapopan	1,049	0	0	3	14	0	1	0	0	3	794	7	123	104
Zapotiltic	11	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	1	1
Zapotitlán de Vadillo	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	9	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Zapotlanejo	24	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	3	4	4
San Ignacio Cerro Gordo	8	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Municipios de Otros Estados	328	0	0	17	134	0	16	3	0	22	48	16	32	40

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 43 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Ocupación Principal	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Estudiante de tiempo completo	5.3%	14.3%	20.0%	3.2%	1.4%	5.9%	11.4%	21.8%	16.1%	6.0%	7.3%	5.3%	5.3%	4.7%
Estudiante con actividad laboral	3.1%	7.1%	2.5%	2.2%	1.2%	0.0%	2.9%	3.8%	21.4%	6.0%	4.0%	6.3%	3.3%	2.5%
Tiene empleo estable > 6 meses	42.8%	35.7%	45.0%	56.5%	49.1%	76.5%	57.7%	34.6%	26.8%	56.4%	43.8%	36.5%	36.6%	36.4%
Tiene menos de 6 meses	14.1%	35.7%	20.0%	8.3%	11.3%	17.6%	10.3%	28.2%	14.3%	11.4%	15.6%	6.9%	17.0%	14.7%
Desempleado (busca empleo)	20.5%	7.1%	10.0%	19.6%	8.7%	0.0%	7.4%	7.7%	21.4%	11.4%	16.5%	31.7%	27.0%	28.8%
Desocupado (no busca empleo)	12.5%	0.0%	0.0%	8.6%	27.6%	0.0%	8.6%	3.8%	0.0%	6.0%	10.1%	9.0%	10.2%	10.7%
Hogar	0.4%	0.0%	2.5%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%	1.1%	0.0%	0.4%
Pensionado	1.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.3%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.7%	1.8%	1.6%	0.6%	1.6%
No aplica	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%
Otra	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	1.6%	0.0%	0.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 44 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Grado Máximo de Estudios	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Primaria	25.3%	14.3%	22.5%	37.8%	32.0%	41.2%	18.3%	16.7%	7.1%	21.5%	19.3%	26.5%	25.3%	22.2%
Secundaria	43.1%	42.9%	42.5%	38.7%	39.1%	47.1%	39.4%	42.3%	53.6%	43.6%	39.3%	50.8%	46.8%	45.9%
Escolaridad Técnica	3.5%	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	0.0%	1.7%	0.0%	5.4%	2.7%	4.8%	2.6%	4.9%	2.7%
Bachillerato	19.7%	35.7%	20.0%	14.9%	17.4%	11.8%	30.3%	30.8%	25.0%	22.1%	24.3%	12.7%	16.5%	21.5%
Licenciatura	5.6%	7.1%	5.0%	3.8%	4.5%	0.0%	5.1%	6.4%	8.9%	7.4%	10.5%	2.6%	3.3%	5.8%
Maestría/doctorado/ Especialidad	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.7%	0.6%	0.0%	0.4%	0.2%
No sabe leer ni escribir	1.4%	0.0%	2.5%	2.0%	2.6%	0.0%	1.7%	2.6%	0.0%	0.7%	0.7%	2.6%	1.3%	0.8%
Sabe leer y escribir	0.9%	0.0%	5.0%	0.2%	0.7%	0.0%	1.7%	1.3%	0.0%	1.3%	0.4%	2.1%	1.3%	0.8%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 45 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado Civil	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Soltero	54.9%	50.0%	50.0%	46.2%	54.3%	29.4%	52.6%	52.6%	73.2%	57.0%	55.0%	59.8%	57.6%	55.1%
Casado	19.2%	0.0%	37.5%	27.2%	23.8%	17.6%	20.0%	14.1%	16.1%	11.4%	18.6%	14.8%	16.3%	17.4%
Unión Libre	15.7%	35.7%	7.5%	14.4%	12.9%	47.1%	18.9%	19.2%	7.1%	18.1%	14.8%	16.9%	17.2%	16.5%
Separado	7.4%	14.3%	5.0%	9.7%	5.5%	5.9%	4.0%	10.3%	0.0%	12.1%	7.7%	6.3%	6.8%	8.6%
Divorciado	2.3%	0.0%	0.0%	2.3%	2.6%	0.0%	4.0%	3.8%	3.6%	0.7%	3.3%	2.1%	1.5%	1.9%
Viudo	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.5%	0.0%	0.6%	0.5%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 46 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN ANTECEDENTE DE BÚSQEDA DE APOYO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Búsqueda de Apoyo	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Primera vez en el año	85.5%	100%	90.0%	90.5%	90.8%	100%	90.3%	97.4%	87.5%	93.3%	82.8%	83.6%	79.8%	85.3%
Ya había acudido en este año	14.5%	0.0%	10.0%	9.5%	9.2%	0.0%	9.7%	2.6%	12.5%	6.7%	17.2%	16.4%	20.2%	14.7%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Cuadro No. 47 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE A RECIBIDO TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número de veces	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Primera Vez	57.1%	50.0%	80.0%	49.6%	51.5%	100%	60.6%	70.5%	69.6%	72.5%	49.5%	66.1%	63.2%	58.2%
2 a 4	35.2%	50.0%	17.5%	39.9%	43.8%	0.0%	32.0%	20.5%	28.6%	25.5%	39.5%	27.0%	31.0%	32.5%
5 a >	7.7%	0.0%	2.5%	10.4%	4.7%	0.0%	7.4%	9.0%	1.8%	2.0%	11.0%	6.9%	5.8%	9.3%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 48 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN LA FORMA EN QUE ACUDE A TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Forma que acude	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Voluntariamente	52.7%	50.0%	65.0%	55.0%	51.5%	76.5%	58.3%	82.1%	60.7%	61.1%	63.9%	40.7%	42.6%	51.7%
Indicación médica no psiquiátrica	5.8%	14.3%	2.5%	3.1%	20.4%	0.0%	2.3%	1.3%	5.4%	0.0%	1.2%	4.8%	0.9%	6.5%
Indicación médica psiquiátrica	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	2.0%	1.6%	0.0%	0.7%	1.8%
Lo llevaron amigos o familiares	36.4%	7.1%	22.5%	38.5%	26.2%	17.6%	36.0%	0.0%	3.6%	16.1%	31.5%	48.7%	53.3%	34.3%
Indicación Legal	1.1%	21.4%	10.0%	0.5%	0.7%	0.0%	0.6%	0.0%	1.8%	2.0%	0.7%	1.1%	0.9%	1.8%
Escuela o trabajo	3.0%	7.1%	0.0%	2.9%	1.2%	5.9%	0.6%	16.7%	28.6%	18.8%	1.0%	4.8%	1.6%	3.9%
Otra (s)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 49 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Drogas de inicio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Alcohol	33.5%	57.1%	52.5%	42.8%	30.5%	47.1%	30.9%	64.1%	58.9%	41.6%	38.8%	27.5%	30.9%	26.7%
Marihuana	16.0%	14.3%	5.0%	10.8%	18.6%	11.8%	12.6%	9.0%	12.5%	15.4%	15.6%	18.5%	17.7%	15.8%
Inhalantes	2.1%	0.0%	0.0%	1.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	3.9%	1.6%	2.0%	2.8%
Alucinógenos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
Heroína	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
Opio/Morfina	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Cocaína	2.4%	0.0%	5.0%	1.1%	1.7%	0.0%	4.6%	1.3%	0.0%	5.4%	2.9%	2.6%	2.7%	2.2%
Tranquilizantes	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.8%	0.0%	0.1%	0.4%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.1%	0.0%	2.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.1%	0.0%	0.0%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	38.3%	28.6%	30.0%	39.6%	28.1%	41.2%	39.4%	24.4%	28.6%	34.2%	32.1%	46.6%	41.3%	47.9%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
Pasta Base	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
Metanfetamina/ Cristal	6.9%	0.0%	2.5%	4.1%	19.7%	0.0%	9.1%	1.3%	0.0%	0.7%	5.0%	2.1%	5.0%	3.9%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 50 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
5 a 9	6.9%	7.1%	2.5%	8.1%	5.3%	23.5%	8.0%	5.1%	8.9%	10.1%	5.3%	12.7%	7.6%	6.7%
10 a 14	46.8%	71.4%	57.5%	46.6%	35.4%	41.2%	43.4%	42.3%	58.9%	55.7%	45.9%	56.6%	50.2%	50.0%
15 a 19	37.6%	21.4%	32.5%	39.7%	39.4%	35.3%	38.9%	47.4%	26.8%	30.2%	40.8%	28.6%	35.2%	37.6%
20 a 24	5.2%	0.0%	5.0%	3.8%	14.2%	0.0%	3.4%	1.3%	3.6%	1.3%	4.3%	2.1%	3.5%	3.0%
25 a 29	1.7%	0.0%	2.5%	1.3%	3.0%	0.0%	5.1%	2.6%	1.8%	1.3%	1.4%	0.0%	1.4%	1.4%
30 a 34	1.0%	0.0%	0.0%	0.2%	2.0%	0.0%	1.1%	1.3%	0.0%	1.3%	1.0%	0.0%	1.2%	0.4%
35 a 39	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.6%	0.3%
40 a 44	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.2%
45 a 49	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
50 a 54	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
55 a 59	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
60 a 64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 a >	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 51 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	Estatal	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Drogas de impacto	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Alcohol	18.4%	28.6%	32.5%	32.2%	16.9%	5.9%	15.4%	38.5%	50.0%	18.1%	20.2%	23.8%	12.9%	14.9%
Marihuana	11.8%	21.4%	22.5%	10.4%	10.9%	11.8%	12.0%	10.3%	19.6%	11.4%	14.9%	15.9%	10.6%	10.6%
Inhalantes	1.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.3%	1.6%	1.1%	1.1%
Alucinógenos	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.8%
Heroína	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.1%	0.2%	0.2%
Opio/Morfina	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%
Cocaína	2.6%	0.0%	0.0%	1.1%	2.2%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	2.0%	3.2%	1.6%	2.1%	3.8%
Tranquilizantes	1.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.5%	1.3%	1.8%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	1.0%	0.1%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	2.6%	0.0%	5.0%	0.9%	0.7%	0.0%	4.0%	3.8%	1.8%	2.7%	2.4%	3.2%	1.9%	5.1%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
Pasta Base	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.5%	0.1%	0.5%
Metanfetamina/ Cristal	60.2%	50.0%	40.0%	54.5%	66.0%	82.4%	51.4%	47.4%	28.6%	62.4%	54.7%	51.3%	67.6%	59.7%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%	2.7%	0.3%	0.5%	0.8%	0.9%
Refractilofeno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 52.1 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Estado	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Aguascalientes	9	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	1	1	1
Baja California Norte	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1
Baja California Sur	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	21	0	0	0	4	0	6	0	0	0	4	1	3	3
Chiapas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chihuahua	5	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Ciudad de México	14	0	0	1	0	0	1	0	0	2	4	0	3	3
Durango	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Guanajuato	31	0	0	3	15	0	0	0	0	1	5	1	4	2
Guerrero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Hidalgo	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Jalisco	5,741	14	40	539	853	17	162	77	56	129	1009	176	1372	1297
México	9	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	0
Michoacán	127	0	0	7	81	0	4	1	0	2	11	4	10	7
Morelos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	17	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4	2	0	3
Nuevo León	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Oaxaca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Querétaro	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Quintana Roo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sinaloa	11	0	0	0	3	0	0	0	0	1	4	0	0	3
Sonora	6	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 52.2 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN ESTADO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Estado	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Tabasco	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Tlaxcala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Veracruz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yucatán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zacatecas	27	0	0	0	7	0	0	0	0	3	6	1	1	9
Otro País	18	0	0	1	2	0	1	0	0	0	11	0	1	2

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 53.1 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Acatic	29	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	9	1
Acatlán de Juárez	16	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	9	2
Ahualulco del Mercado	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Amacueca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	12	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0
Ameca	70	0	0	0	1	0	3	0	0	48	2	0	7	9
San Juanito de Escobedo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Arandas	102	0	0	60	34	0	0	0	0	1	0	0	3	4
Arenal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2
Atemajac de Brizuela	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Atengo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	36	0	0	11	23	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Atoyac	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Autlán de Navarro	60	0	0	0	2	0	4	53	0	0	0	0	1	0
Ayotlán	20	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ayutla	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Barca	69	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Bolaños	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Zapotlán El Grande	105	0	0	0	3	0	95	0	0	0	2	0	2	3
Cocula	14	0	0	0	9	0	0	1	0	2	0	1	0	1
Colotlán	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Concepción de Buenos Aires	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 53.2 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Cuautitlán de García Barragán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	135	0	0	0	89	0	0	0	0	0	4	0	37	5
Chimaltitlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	3
Grullo	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0
Guachinango	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	1,445	0	0	15	50	0	4	0	0	26	128	16	374	832
Hostotipaquillo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejúcar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Huerta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	39	0	0	1	12	0	0	0	0	1	1	1	18	5
Ixtlahuacán del Río	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Jalostotitlán	8	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	30	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jesús María	16	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Jilotlán de los Dolores	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jocotepec	48	0	0	0	35	0	0	0	0	0	1	0	11	1
Juanacatlán	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Juchitlán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 53.3 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Lagos de Moreno	28	0	19	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
El Limón	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Magdalena	10	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2
Santa María del Oro	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	19	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	1	0
Mazamitla	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Mexicacán	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mixtlán	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Ocotlán	249	0	0	3	238	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Ojuelos de Jalisco	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pihuamo	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	56	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Puerto Vallarta	27	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	2	7
Villa Purificación	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Quitupan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salto	78	0	0	2	10	0	0	0	0	0	3	5	35	23
San Cristóbal de la Barranca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	53	0	17	23	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1
San Julián	9	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Martín de Hidalgo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2
San Miguel el Alto	9	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 53.4 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Gómez Farías	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
San Sebastián del Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Santa María de los Ángeles	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sayula	16	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	3	1
Tala	13	0	0	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	3
Talpa de Allende	21	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	0
Tamazula de Gordiano	24	0	0	0	0	17	4	0	0	1	2	0	0	0
Tapalpa	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tecalitlán	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tenamaxtlán	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Teocaltiche	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	391	0	0	336	39	0	0	0	0	0	5	0	1	10
Tequila	7	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0
Teuchitlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tizapán el Alto	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Tlajomulco de Zúñiga	263	0	0	5	2	0	0	0	0	0	19	4	152	81
Tlaquepaque	559	0	0	2	6	0	0	0	0	2	18	13	423	95
Tolimán	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Tonalá	298	0	0	1	5	0	0	0	0	1	12	113	90	76
Tonaya	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Totatiche	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 53.5 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO SEGÚN EL MUNICIPIO EN QUE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Tototlán	24	0	0	0	21	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Tuxcacuesco	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxpan	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0
Unión de San Antonio	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	8	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Villa Corona	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Villa Guerrero	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yahualica de González Gallo	14	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	7	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	1
Zapopan	1,033	0	0	3	16	0	3	0	0	3	789	6	114	99
Zapotiltic	10	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	1
Zapotitlán de Vadillo	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	9	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zapotlanejo	22	0	0	3	8	0	0	0	0	0	1	2	4	4
San Ignacio Cerro Gordo	8	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipios de Otros Estados	332	0	0	17	138	0	13	1	0	20	53	13	37	40

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 54 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO POR USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Uso de drogas inyectadas	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Si	3.6%	0.0%	2.5%	4.0%	3.4%	0.0%	1.1%	0.0%	3.6%	3.4%	3.5%	6.3%	3.2%	4.6%
No	96.4%	100%	97.5%	96.0%	96.6%	100%	98.9%	100%	96.4%	96.6%	96.5%	93.7%	96.8%	95.4%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Cuadro No. 55 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO QUE COMPARTE JERINGAS CON EL USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Comparte jeringas	221	0	1	22	34	0	2	0	2	5	37	12	45	61
Si	79.2%		100%	90.9%	85.3%		100%		100%	60.0%	83.8%	66.7%	71.1%	77.0%
No	20.8%		0.0%	9.1%	14.7%		0.0%		0.0%	40.0%	16.2%	33.3%	28.9%	23.0%
No sabe	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 56 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO QUE USARON DROGAS INTAVENOSAS CON JERINGA NUEVA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Usó jeringa sin uso previo	221	0	1	22	34	0	2	0	2	5	37	12	45	61
Si	30.8%		0.0%	27.3%	26.5%		50.0%		0.0%	0.0%	24.3%	41.7%	33.3%	37.7%
No	69.2%		100%	77.3%	73.5%		50.0%		100%	100%	75.7%	58.3%	64.4%	62.3%
No sabe	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%		0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Cuadro No. 57 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO CONSUMO DE DROGAS EN FORMA COMBINADA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Combina Drogas	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Si	53.3%	100%	57.5%	66.5%	39.8%	35.3%	59.4%	52.6%	46.4%	59.7%	40.6%	69.3%	58.6%	58.3%
No	46.5%	0.0%	42.5%	33.5%	60.2%	64.7%	40.6%	47.4%	53.6%	40.3%	59.4%	30.7%	40.2%	41.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 58 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO QUE CONDUCEN BAJO EL EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Conducción bajo efecto de drogas	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Si	49.3%	71.4%	27.5%	79.9%	43.8%	35.3%	60.0%	64.1%	50.0%	65.8%	34.2%	51.9%	48.5%	49.4%
No	50.2%	28.6%	55.0%	19.4%	55.5%	58.8%	40.0%	34.6%	50.0%	34.2%	65.5%	47.6%	50.8%	50.5%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%

Cuadro No. 59 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO REFIEREN APDECER UNA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Padece alguna enfermedad	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
Si	7.8%	35.7%	0.0%	9.2%	1.3%	23.5%	12.0%	7.7%	3.6%	11.4%	8.5%	25.9%	2.9%	13.0%
No	92.2%	64.3%	100%	90.8%	98.7%	76.5%	88.0%	92.3%	96.4%	88.6%	91.5%	74.1%	97.1%	87.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 60 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
SEGÚN LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Lugar	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
En su propia casa	9.2%	14.3%	2.5%	10.6%	4.1%	5.9%	6.3%	15.4%	3.6%	4.0%	9.4%	7.9%	10.4%	12.1%
Se la llevan a su casa	6.4%	0.0%	2.5%	1.8%	4.6%	0.0%	9.1%	3.8%	1.8%	11.4%	11.4%	2.1%	7.0%	5.5%
En casa de un amigo o familiar	7.2%	7.1%	2.5%	3.8%	5.2%	0.0%	2.9%	6.4%	10.7%	12.8%	10.8%	4.8%	8.4%	6.4%
En la calle	40.8%	71.4%	25.0%	48.4%	67.9%	82.4%	53.7%	32.1%	35.7%	29.5%	29.7%	25.4%	33.4%	36.4%
En antros y bares	2.4%	0.0%	2.5%	2.5%	1.8%	0.0%	1.7%	1.3%	7.1%	2.7%	6.2%	1.6%	1.0%	1.3%
En fiestas y reuniones	1.8%	0.0%	0.0%	2.2%	1.5%	0.0%	3.4%	6.4%	12.5%	0.7%	2.2%	6.9%	1.2%	0.7%
En la escuela	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.7%	0.6%	0.0%	0.4%	0.2%
En el trabajo	2.4%	0.0%	2.5%	3.4%	1.1%	5.9%	1.1%	6.4%	0.0%	2.0%	2.3%	2.1%	2.1%	3.3%
En tiendas cercanas a mi casa	18.3%	0.0%	62.5%	20.0%	10.5%	5.9%	10.9%	11.5%	28.6%	32.2%	16.6%	18.0%	18.7%	22.7%
Parques	0.9%	0.0%	0.0%	0.2%	0.8%	0.0%	0.6%	2.6%	0.0%	0.0%	1.4%	0.5%	0.9%	1.2%
Picaderos	10.1%	0.0%	0.0%	6.3%	2.3%	0.0%	9.7%	14.1%	0.0%	4.0%	9.4%	30.2%	16.4%	10.1%
Otro	0.1%	7.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 61 PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS EN JALISCO
LUGAR DONDE CONSUME LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Lugar	6,073	14	40	556	991	17	175	78	56	149	1062	189	1409	1337
La tiene en su casa	41.4%	21.4%	47.5%	74.8%	40.5%	11.8%	45.7%	28.2%	25.0%	36.9%	37.4%	31.2%	38.1%	38.1%
En casa de un amigo o familiar	12.3%	0.0%	12.5%	4.3%	9.6%	11.8%	9.1%	14.1%	14.3%	14.1%	14.1%	9.0%	16.2%	12.7%
En la vía pública (calles, parques)	31.3%	71.4%	27.5%	8.8%	41.0%	58.8%	24.6%	30.8%	25.0%	34.9%	28.9%	33.9%	31.5%	34.9%
En antros y bares	2.9%	0.0%	2.5%	2.0%	2.6%	0.0%	3.4%	0.0%	8.9%	3.4%	7.4%	2.1%	1.3%	1.7%
En fiestas y reuniones	3.3%	0.0%	0.0%	3.2%	1.7%	0.0%	6.3%	6.4%	19.6%	2.7%	5.8%	9.0%	2.3%	1.6%
En la escuela	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	1.3%	0.0%	1.3%	0.9%	0.0%	0.4%	0.2%
En el trabajo	5.1%	0.0%	7.5%	5.4%	3.6%	17.6%	5.7%	9.0%	7.1%	4.7%	2.4%	5.8%	6.2%	6.6%
En picaderos	3.0%	0.0%	2.5%	0.4%	0.9%	0.0%	4.0%	10.3%	0.0%	1.3%	2.8%	8.5%	3.9%	4.0%
Otro	0.1%	7.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
No responde	0.1%	0.0%	0.0%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 63.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,116	4	13	179	167	1	27	30	28	27	214	45	182	199
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	62.1%	75.0%	92.3%	45.8%	96.4%	100%	85.2%	50.0%	42.9%	70.4%	41.6%	60.0%	64.3%	66.3%
Menor efecto que antes	57.2%	75.0%	53.8%	25.1%	97.0%	100%	51.9%	43.3%	46.4%	51.9%	43.9%	64.4%	62.6%	64.8%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	58.2%	75.0%	53.8%	42.5%	96.4%		40.7%	43.3%	46.4%	51.9%	39.7%	57.8%	60.4%	65.3%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	59.6%	75.0%	69.2%	73.7%	94.0%	100%	85.2%	40.0%	21.4%	51.9%	35.5%	55.6%	52.7%	55.8%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	42.8%	75.0%	23.1%	17.9%	94.6%		44.4%	40.0%	14.3%	40.7%	27.1%	35.6%	40.1%	48.2%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 63.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,116	4	13	179	167	1	27	30	28	27	214	45	182	199
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	67.2%	100%	92.3%	82.1%	84.4%	100%	77.8%	53.3%	39.3%	85.2%	43.9%	64.4%	67.6%	64.3%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	57.1%	100%	30.8%	37.4%	94.0%		51.9%	56.7%	46.4%	55.6%	38.8%	51.1%	60.4%	65.3%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	66.4%	75%	92.3%	80.4%	95.8%	100%	77.8%	60.0%	46.4%	70.4%	38.8%	57.8%	64.8%	61.8%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	55.5%	75.0%	53.8%	58.7%	94.0%	100%	51.9%	53.3%	28.6%	29.6%	33.6%	33.3%	58.8%	53.3%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 63.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,116	4	13	179	167	1	27	30	28	27	214	45	182	199
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	37.9%	75.0%	53.8%	21.2%	73.7%		40.7%	53.3%	14.3%	40.7%	20.6%	28.9%	41.8%	38.7%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	53.7%	75.0%	30.8%	53.6%	95.8%	100%	59.3%	53.3%	25.0%	48.1%	26.2%	44.4%	57.1%	51.8%
Descuido de actividades	54.4%	75.0%	61.5%	34.1%	96.4%	100%	51.9%	56.7%	35.7%	44.4%	38.3%	53.3%	58.2%	54.3%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	38.4%	75.0%	46.2%	44.7%	67.1%		44.4%	46.7%	21.4%	48.1%	23.4%	20.0%	33.5%	31.7%
Continuó usando a pesar de esos problemas	45.1%	75.0%	38.5%	43.6%	88.6%		48.1%	50.0%	21.4%	55.6%	25.2%	24.4%	40.1%	41.2%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	64.9%	75.0%	100.0 %	74.9%	91.0%		81.5%	60.0%	50.0%	66.7%	41.1%	57.8%	64.3%	59.8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	64.9%	75.0%	100.0 %	75.4%	91.0%		81.5%	63.3%	42.9%	66.7%	43.5%	55.6%	62.6%	59.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 64 PROPORCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS DEL SEXO MASCULINO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	1,116	4	13	179	167	1	27	30	28	27	214	45	182	199
5 a 9	4.0%			7.8%	4.2%		3.7%	3.3%	7.1%		2.3%	4.4%	4.4%	2.5%
10 a 14	27.9%	75%	30.8%	33.0%	24.0%		37.0%	33.3%	50.0%	44.4%	21.0%	37.8%	27.5%	23.6%
15 a 19	49.6%	25.0%	38.5%	45.3%	41.3%	100%	44.4%	56.7%	25.0%	37.0%	57.5%	51.1%	54.9%	52.8%
20 a 24	11.0%		7.7%	9.5%	21.6%				7.1%	11.1%	11.2%	4.4%	5.5%	14.1%
25 a 29	3.5%		15.4%	3.4%	4.8%		7.4%		10.7%		2.8%		3.3%	3.0%
30 a 34	1.8%		7.7%	1.1%	2.4%			3.3%			2.3%		2.2%	1.5%
35 a 39	1.3%				1.2%		3.7%			3.7%	2.3%		2.2%	1.0%
40 a 44	0.4%						3.7%					2.2%		1.0%
45 a 49	0.4%				0.6%			3.3%		3.7%				0.5%
50 a 54	0.1%										0.5%			
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 65.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	717	3	9	58	108	2	21	8	11	17	158	30	150	142
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	55.6%	100%	22.2%	25.9%	90.7%	100%	71.4%	50.0%	54.5%	58.8%	43.7%	76.7%	43.3%	61.3%
Menor efecto que antes	54.5%	100%	11.1%	20.7%	90.7%	100%	28.6%	37.5%	45.5%	47.1%	48.1%	66.7%	46.7%	61.3%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	54.3%	100%	11.1%	46.6%	90.7%	100%	28.6%	37.5%	36.4%	47.1%	44.9%	70.0%	40.7%	59.2%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	49.9%	100%	22.2%	53.4%	90.7%	100%	76.2%	37.5%	36.4%	58.8%	31.6%	66.7%	33.3%	48.6%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	39.6%	100%	22.2%	20.7%	89.8%	100%	28.6%	37.5%	18.2%	35.3%	25.3%	53.3%	25.3%	40.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 65.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	717	3	9	58	108	2	21	8	11	17	158	30	150	142
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	57.6%	100%	44.4%	69.0%	85.2%	50.0%	85.7%	75.0%	54.5%	70.6%	44.3%	76.7%	37.3%	57.7%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	50.3%	100%	11.1%	29.3%	87.0%	50.0%	19.0%	75.0%	36.4%	29.4%	39.2%	66.7%	40.0%	59.2%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	45.7%	100%	22.2%	44.8%	88.9%	50.0%	52.4%	25.0%	36.4%	47.1%	34.8%	40.0%	31.3%	43.0%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	41.0%	100%	22.2%	34.5%	88.0%	50.0%	33.3%	25.0%	18.2%	29.4%	33.5%	40.0%	30.7%	32.4%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 65.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	717	3	9	58	108	2	21	8	11	17	158	30	150	142
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	36.5%	100%	11.1%	13.8%	77.8%	50.0%	33.3%		18.2%	29.4%	29.1%	56.7%	28.0%	32.4%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	42.7%	100%	11.1%	36.2%	88.0%	50.0%	33.3%		18.2%	52.9%	30.4%	53.3%	34.7%	35.9%
Descuido de actividades	46.9%	100%	22.2%	29.3%	90.7%	50.0%	38.1%		36.4%	47.1%	32.9%	60.0%	35.3%	50.7%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	30.3%	100%	11.1%	10.3%	81.5%		28.6%		18.2%	35.3%	18.4%	33.3%	16.7%	28.9%
Continuó usando a pesar de esos problemas	34.2%	100%	11.1%	13.8%	85.2%		28.6%		36.4%	47.1%	22.2%	40.0%	24.7%	27.5%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	54.8%	100%	44.4%	50.0%	87.0%		90.5%	62.5%	72.7%	76.5%	37.3%	76.7%	40.0%	53.5%
Continúa usando a pesar de esos problemas	55.4%	100%	33.3%	48.3%	87.0%		85.7%	62.5%	72.7%	82.4%	38.0%	70.0%	42.7%	55.6%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 66 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	717	3	9	58	108	2	21	8	11	17	158	30	150	142
5 a 9	2.1%			1.7%			9.5%		9.1%	11.8%	3.8%	3.3%		1.4%
10 a 14	41.1%	33.3%	55.6%	50.0%	19.4%	100%	33.3%	37.5%	63.6%	35.3%	41.8%	63.3%	44.0%	44.4%
15 a 19	44.5%	66.7%	44.4%	43.1%	43.5%		52.4%	37.5%	27.3%	47.1%	43.7%	23.3%	46.7%	49.3%
20 a 24	8.2%			5.2%	24.1%			25.0%		5.9%	5.7%	10.0%	6.7%	3.5%
25 a 29	2.2%				4.6%						4.4%		2.7%	
30 a 34	1.4%				6.5%		4.8%				0.6%			0.7%
35 a 39	0.3%				0.9%									0.7%
40 a 44	0.1%				0.9%									
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 67.1: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	59	-	-	2	9	-	-	-	-	1	14	3	15	15
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	57.6%			50.0%	100%						21.4%	66.7%	46.7%	80.0%
Menor efecto que antes	59.3%				100%						14.3%	66.7%	53.3%	93.3%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	61.0%			50.0%	100%						14.3%	66.7%	60%	86.7%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	62.7%			100%	100%						21.4%	66.7%	60%	80.0%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	57.6%				100%						14.3%	66.7%	60%	80.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 67.2: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	59	-	-	2	9	-	-	-	-	1	14	3	15	15
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	57.6%			100%	100%					100%	21.4%	66.7%	60%	53.3%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	55.9%			50.0%	100%							66.7%	53.3%	86.7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	59.3%			100%	100%						7.1%	66.7%	66.7%	73.3%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	52.5%			50%	100%							66.7%	66.7%	60.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 67.3: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS DEL SEXO MASCULINO POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	59	-	-	2	9	-	-	-	-	1	14	3	15	15
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	40.7%				66.7%						7.1%	66.7%	46.7%	53.3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	52.5%			10%	100%							66.7%	46.7%	73.3%
Descuido de actividades	61.0%			50%	100%						14.3%	66.7%	60.0%	86.7%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	50.8%			50%	100%						21.4%	66.7%	40%	60%
Continuó usando a pesar de esos problemas	50.8%			50%	100%						14.3%	66.7%	46.7%	60%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	59.3%			100%	100%						21.4%	66.7%	60%	66.7%
Continúa usando a pesar de esos problemas	52.5%			100%	100%							66.7%	53.3%	66.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 68 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
INHALANTES	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	59	-	-	2	9	-	-	-	-	1	14	3	15	15
5 a 9	5.1%			50%						100%			6.7%	
10 a 14	37.3%			50%	55.6%						57.1%	66.7%	20.0%	20.0%
15 a 19	39.0%				22.2%						42.9%		46.7%	53.3%
20 a 24	10.2%				11.1%								6.7%	26.7%
25 a 29	3.4%				11.1%								6.7%	
30 a 34														
35 a 39	1.7%												6.7%	
40 a 44														
45 a 49	1.7%											33.3%		
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64	1.7%												6.7%	
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 69.1: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	158	-	-	6	22	-	10	-	-	3	34	3	29	51
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	70.9%			83.3%	100%		80%			100%	50.0%	66.7%	62.1%	72.5%
Menor efecto que antes	63.3%			16.7%	100%		10%			100%	52.9%	100%	58.6%	68.6%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	63.3%			33.3%	100%		10%			100%	44.1%	66.7%	58.6%	74.5%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	63.3%			100%	95.5%		70%			100%	47.1%	66.7%	41.4%	64.7%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	55.7%			33.3%	100%		10%			100%	38.2%	66.7%	41.4%	64.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 69.2: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	158	-	-	6	22	-	10	-	-	3	34	3	29	51
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	67.7%			83.3%	95.5%		90%			66.7%	52.9%	100%	65.5%	58.8%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	64.6%			50%	100%		40%			100%	58.8%	66.7%	44.8%	68.6%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	65.8%			100%	100%		40%			66.7%	61.8%	66.7%	58.6%	58.8%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	55.1%			66.7%	100%		20%			100%	38.2%	66.7%	51.7%	51%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 69.3: CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	158	-	-	6	22	-	10	-	-	3	34	3	29	51
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	41.1%			50%	86.4%		50%			100%	17.6%	66.7%	41.4%	29.4%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	55.1%				100%		40%			100%	41.2%	66.7%	62.1%	47.1%
Descuido de actividades	60.8%			50%	100%		20%			100%	47.1%	66.7%	55.2%	62.7%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	45.6%			83.3%	90.9%		40%			100%	35.3%	66.7%	27.6%	35.3%
Continuó usando a pesar de esos problemas	49.4%			83.3%	90.9%		20%			100%	41.2%	66.7%	34.5%	43.1%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	65.2%			66.7%	95.5%		60%			100%	58.8%	100%	58.6%	56.9%
Continúa usando a pesar de esos problemas	62.0%			66.7%	95.5%		60%			100%	52.9%	100%	51.7%	54.9%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 70 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	158	-	-	6	22	-	10	-	-	3	34	3	29	51
5 a 9														
10 a 14	10.8%			16.7%	4.5%		20.0%			33.3%	8.8%	66.7%	6.9%	9.8%
15 a 19	58.9%			33.3%	50.0%		40.0%			33.3%	64.7%	33.3%	72.4%	60.8%
20 a 24	15.2%			50.0%	22.7%					33.3%	8.8%		10.3%	17.6%
25 a 29	9.5%				18.2%		40.0%				8.8%		6.9%	3.9%
30 a 34	0.6%													2.0%
35 a 39	3.8%				4.5%						2.9%		3.4%	5.9%
40 a 44	0.6%										2.9%			
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64	0.6%										2.9%			
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 71.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	156	-	2	5	7	-	7	3	1	4	26	6	27	68
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	49.4%			80.0%	100%		14.3%	33.3%	100%	75.0%	23.1%	33.3%	51.9%	55.9%
Menor efecto que antes	47.4%			60.0%	100%		14.3%	33.3%	100%	25.0%	26.9%	50%	51.9%	52.9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	45.5%			60.0%	100%		28.6%	33.3%	100%	25.0%	19.2%	16.7%	48.1%	54.4%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	46.2%		50.0%	80.0%	85.7%		57.1%	33.3%	100%	75.0%	15.4%	16.7%	40.7%	52.9%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	32.7%		50.0%	20.0%	85.7%		14.3%	33.3%	100%	25.0%	3.8%		44.4%	38.2%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 71.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	156	-	2	5	7	-	7	3	1	4	26	6	27	68
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	40.4%			20%	85.7%		57.1%	33.3%	100%	50.0%	7.7%	50%	48.1%	44.1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	41.7%				85.7%		28.6%	33.3%	100%	50%	15.4%	33.3%	33.3%	55.9%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	39.1%				85.7%		57.1%	33.3%	100%	50%	11.5%	16.7%	37.0%	48.5%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	32.1%				85.7%		14.3%	33.3%	100%	25%	11.5%	16.7%	29.6%	41.2%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 71.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	156	-	2	5	7	-	7	3	1	4	26	6	27	68
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	23.7%				28.6%		42.9%	33.3%	100%	25.0%	3.8%		25.9%	30.9%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	25.0%				85.7%		14.3%	33.3%	100%	25.0%	7.7%		18.5%	32.4%
Descuido de actividades	30.8%				85.7%		14.3%	33.3%	100%	25.0%	15.4%	16.7%	25.9%	38.2%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	32.1%				85.7%		57.1%	33.3%	100%	50.0%	7.7%	16.7%	22.2%	39.7%
Continuó usando a pesar de esos problemas	33.3%				85.7%		28.6%	33.3%	100%	50.0%	7.7%	16.7%	29.6%	42.6%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	36.5%				85.7%		42.9%	33.3%	100%	75.0%	15.4%	16.7%	29.6%	44.1%
Continúa usando a pesar de esos problemas	36.5%				85.7%		42.9%	33.3%	100%	75.0%	7.7%	16.7%	29.6%	47.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 72 EDAD DE INICIO EN PACIENTES ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de inicio	156	-	2	5	7	-	7	3	1	4	26	6	27	68
5 a 9	3.2%			20%	14.3%								3.7%	2.9%
10 a 14	39.1%		50%	60%			57.1%		100%	50%	42.3%	33.3%	40.7%	38.2%
15 a 19	44.9%		50%	20%	71.4%		42.9%	66.7%		50%	34.6%	66.7%	29.6%	51.5%
20 a 24	7.1%				14.3%						7.7%		11.1%	7.4%
25 a 29	2.6%							33.3%					11.1%	
30 a 34	1.3%										7.7%			
35 a 39	1.3%										7.7%			
40 a 44														
45 a 49														
50 a 54	0.6%												3.7%	
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 73.1 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	3,658	7	16	303	654	14	90	37	16	93	581	97	952	798
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	76.1%	100%	75.0%	50.2%	96.9%	100%	86.7%	94.6%	75.0%	72.0%	61.6%	87.6%	70.5%	82.3%
Menor efecto que antes	74.1%	85.7%	25.0%	27.7%	96.8%	92.9%	48.9%	91.9%	93.8%	59.1%	66.3%	84.5%	72.3%	83.5%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	72.7%	85.7%	25.0%	39.3%	96.6%	85.7%	46.7%	89.2%	93.8%	54.8%	61.6%	85.6%	69.5%	80.3%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	71.3%	100%	93.8%	83.2%	92.8%	57.1%	88.9%	86.5%	75.0%	63.4%	56.8%	78.4%	59.5%	70.6%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	59.5%	100%	31.3%	18.5%	90.4%	42.9%	47.8%	83.8%	62.5%	39.8%	51.1%	70.1%	49.8%	69.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 73.2 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	3,658	7	16	303	654	14	90	37	16	93	581	97	952	798
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	73.2%	100%	87.5%	86.1%	83.8%	42.9%	93.3%	81.1%	56.3%	77.4%	63.5%	75.3%	68%	69.8%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	67.1%	100%	18.8%	34.3%	90.2%	28.6%	38.9%	78.4%	93.8%	50.5%	58.2%	71.1%	63.9%	75.7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	78.6%	100%	100%	85.1%	96.0%	28.6%	82.2%	86.5%	75.0%	81.7%	66.4%	87.6%	72.5%	76.1%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	67.9%	100%	25%	59.4%	94.0%	21.4%	48.9%	89.2%	75.0%	48.4%	57.3%	73.2%	63.6%	66.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 73.3 CRITERIOS DE DEPENDENCIA EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	3,658	7	16	303	654	14	90	37	16	93	581	97	952	798
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	55.8%	100%	68.8%	27.4%	69.9%	7.1%	73.3%	86.5%	50.0%	37.6%	53.0%	55.7%	54.1%	58.3%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	68.9%	100%	31.3%	49.2%	94.0%	35.7%	54.4%	86.5%	62.5%	45.2%	58.9%	75.3%	64.1%	72.8%
Descuido de actividades	74.6%	100%	25.0%	44.9%	96.5%	42.9%	44.4%	86.5%	75.0%	52.7%	64.0%	84.5%	74.3%	81.5%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	48.2%	85.7%	50%	32.0%	75.1%	14.3%	45.6%	70.3%	50%	60.2%	41.5%	51.5%	40.9%	43.6%
Continuó usando a pesar de esos problemas	53.8%	71.4%	50%	31.4%	78.7%	7.1%	45.6%	75.7%	56.3%	58.1%	46.6%	69.1%	48.8%	51.1%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	76.7%	100%	93.8%	80.2%	86.9%	64.3%	96.7%	91.9%	68.8%	76.3%	65.7%	95.9%	72.6%	74.6%
Continúa usando a pesar de esos problemas	77.0%	100%	93.8%	79.5%	86.9%	64.3%	92.2%	91.9%	68.8%	75.3%	65.9%	95.9%	72.3%	76.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 74 EDAD DE INICIO EN PACIENTES DEL SEXO MASCULINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	3,658	7	16	303	654	14	90	37	16	93	581	97	952	798
5 a 9	0.1%				0.2%								0.1%	0.1%
10 a 14	9.8%		6.3%	14.9%	7.6%	21.4%	14.4%	13.5%		10.8%	10.0%	7.2%	10.1%	8.8%
15 a 19	43.5%	57.1%	50.0%	42.2%	43.3%	50%	34.4%	40.5%	43.8%	36.6%	47.3%	52.6%	44.7%	40.4%
20 a 24	20.9%	14.3%	12.5%	19.1%	32.0%	14.3%	18.9%	13.5%	6.3%	17.2%	18.2%	15.5%	18.6%	19.3%
25 a 29	11.4%		6.3%	13.2%	9.9%	7.1%	21.1%	18.9%	12.5%	18.3%	9.8%	6.2%	10.7%	12.5%
30 a 34	6.2%	28.6%	25.0%	3.6%	4.7%		3.3%	8.1%	12.5%	10.8%	7.9%	6.2%	6.3%	6.1%
35 a 39	3.7%			3.6%	1.2%	7.1%	5.6%	2.7%	12.5%	5.4%	2.4%	4.1%	4.9%	4.9%
40 a 44	2.1%			1.3%	0.6%		2.2%	2.7%	12.5%		1.7%	4.1%	1.8%	3.9%
45 a 49	1.6%			1.3%	0.5%						1.7%	3.1%	2.2%	2.0%
50 a 54	0.4%			0.7%						1.1%	0.3%	1.0%	0.3%	0.9%
55 a 59	0.3%										0.5%			0.9%
60 a 64	0.1%												0.1%	0.3%
65 a >														

SEXO FEMENINO Y POR REGIÓN SANITARIA

Cuadro No. 75 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS QUE PREFIEREN EL ANONIMATO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	22.6%	0.0%	23.0%	3.4%	78.8%	38.0%
No	70.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.7%	100.0%	100.0%	100.0%	77.4%	100.0%	77.0%	96.6%	21.2%	62.0%

Cuadro No. 76 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON EMBARAZO DURANTE EL TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Embarazo	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	1.3%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	4.1%	3.4%	1.5%	1.0%
No	98.7%	100.0%	100.0%	98.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.4%	95.9%	96.6%	98.5%	99.0%
No respuesta	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 77 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EDAD EN QUE ACUDEN A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de afluencia	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
5 a 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 a 14	8.1%	0.0%	5.0%	14.8%	0.6%	0.0%	12.5%	4.5%	38.7%	10.7%	2.7%	20.7%	10.1%	5.2%
15 a 19	22.1%	100.0%	25.0%	13.1%	5.1%	100%	75.0%	36.4%	16.1%	39.3%	20.3%	24.1%	24.7%	28.2%
20 a 24	22.1%	0.0%	15.0%	17.2%	32.7%	0.0%	0.0%	22.7%	6.5%	17.9%	14.9%	31.0%	26.8%	19.7%
25 a 29	14.6%	0.0%	35.0%	20.5%	16.7%	0.0%	0.0%	18.2%	6.5%	7.1%	14.9%	3.4%	15.2%	12.5%
30 a 34	9.5%	0.0%	10.0%	7.4%	16.0%	0.0%	0.0%	4.5%	9.7%	3.6%	2.7%	3.4%	8.6%	11.1%
35 a 39	7.9%	0.0%	5.0%	9.0%	12.8%	0.0%	12.5%	4.5%	16.1%	0.0%	12.2%	6.9%	3.5%	7.2%
40 a 44	5.7%	0.0%	5.0%	6.6%	5.8%	0.0%	0.0%	4.5%	3.2%	10.7%	9.5%	6.9%	4.5%	5.2%
45 a 49	2.9%	0.0%	0.0%	5.7%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	0.0%	1.5%	1.6%
50 a 54	3.6%	0.0%	0.0%	2.5%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	7.1%	5.4%	0.0%	2.0%	5.2%
55 a 59	1.8%	0.0%	0.0%	1.6%	0.6%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	3.6%	5.4%	0.0%	0.5%	2.6%
60 a 64	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	3.4%	1.0%	1.3%
65 a >	0.7%	0.0%	0.0%	1.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	1.5%	0.0%
S/D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 78.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Estado.	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Aguascalientes	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Distrito Federal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	956	2	20	120	135	2	8	22	30	27	70	29	190	301
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	18	0	0	1	13	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	4	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 78.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN ESTADO DE RESIDENCIA TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Estado.	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Yucatán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Zacatecas	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otro País	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 79.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Municipio	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Acatic	5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acatlán de Juárez	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahualulco del Mercado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Amacueca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameca	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
San Juanito de Escobedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arandas	40	0	0	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atemajac de Brizuela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atengo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	16	0	0	3	8	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Atoyac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autlán de Navarro	19	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	1
Ayotlán	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayutla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barca	10	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolaños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán El Grande	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Cocula	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Colotlán	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepción de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautitlán de García Barragán	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 79.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Municipio	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Cuautla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	10	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Chimaltitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Grullo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guachinango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	225	0	0	2	5	0	0	0	0	6	20	0	32	160
Hostotipaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejúcar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huerta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ixtlahuacán del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalostotitlán	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Jesús María	7	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jilotlán de los Dolores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jocotepec	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juanacatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juchitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagos de Moreno	13	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 79.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Municipio	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa María del Oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Mazamitla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mexxicacán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mixtlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocotlán	54	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojuelos de Jalisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pihuamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	10	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Vallarta	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Villa Purificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quitupan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salto	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	11
San Cristóbal de la Barranca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	11	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Julián	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Miguel el Alto	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gómez Farías	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
San Sebastián del Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa María de los Ángeles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 79.4: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Municipio	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Sayula	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Talpa de Allende	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Tamazula de Gordiano	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapalpa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tecalitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenamaxtlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teocaltiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	54	0	0	46	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Tequila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teuchitlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tizapán el Alto	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlajomulco de Zúñiga	62	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	30	26
San Pedro Tlaquepaque	108	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	67	36
Tolimán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tonalá	63	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	14	24	19
Tonaya	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totatiche	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tototlán	6	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcacuesco	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxpan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 79.5: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
CON MUNICIPIO DE RESIDENCIA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Municipio	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Unión de San Antonio	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Corona	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yahualica de González Gallo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapopan	88	0	0	1	2	0	0	0	0	1	36	0	20	28
Zapotiltic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotitlán de Vadillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlanejo	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
San Ignacio Cerro Gordo	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipios de Otros Estados	41	0	0	2	21	0	0	0	1	1	4	0	8	4

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 80 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Ocupación Principal	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Estudiante de tiempo completo	15%	0.0%	35%	12.3%	2.6%	0.0%	37.5%	31.8%	48.4%	10.7%	13.5%	34.5%	17.2%	13.8%
Estudiante con actividad laboral	5.3%	0.0%	5%	6.6%	1.9%	0.0%	37.5%	0.0%	6.5%	14.3%	5.4%	13.8%	4.0%	5.2%
Tiene empleo estable > 6 meses	17.5%	0.0%	20%	24.6%	10.3%	50%	0.0%	13.6%	19.4%	17.9%	28.4%	10.3%	17.2%	16.7%
Tiene menos de 6 meses	9.6%	0.0%	15%	9.8%	1.9%	0.0%	0.0%	4.5%	6.5%	7.1%	5.4%	10.3%	13.1%	13.1%
Desempleado (busca empleo)	6.9%	0.0%	5%	6.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	7.1%	10.8%	3.4%	8.6%	8.9%
Desocupado (no busca empleo)	12.2%	100%	0.0%	9%	16.7%	0.0%	12.5%	22.7%	12.9%	7.1%	10.8%	3.4%	18.2%	8.5%
Hogar	32.4%	0.0%	20%	31.1%	64.1%	50.0%	12.5%	27.3%	3.2%	35.7%	24.3%	17.2%	21.2%	31.8%
Pensionado	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	3.4%	0.5%	0.7%
No aplica	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
Otra	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 81 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Grado Máximo de Estudios	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Primaria	22.8%	0.0%	15.0%	19.7%	32.1%	0.0%	12.5%	13.6%	3.2%	28.6%	21.6%	13.8%	23.2%	23.3%
Secundaria	43.7%	50.0%	35.0%	45.9%	40.4%	50.0%	0.0%	50.0%	61.3%	39.3%	23.0%	62.1%	50.5%	43.3%
Escolaridad Técnica	3.5%	0.0%	5.0%	4.9%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	3.6%	6.8%	0.0%	2.5%	3.9%
Bachillerato	21.1%	50.0%	25.0%	18.9%	19.2%	50.0%	75.0%	36.4%	9.7%	21.4%	33.8%	17.2%	21.2%	18.0%
Licenciatura	5.6%	0.0%	15.0%	6.6%	1.9%	0.0%	12.5%	0.0%	19.4%	7.1%	13.5%	3.4%	1.0%	6.6%
Maestría/doctorado/ Especialidad	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe leer ni escribir	0.8%	0.0%	5.0%	1.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
Sabe leer y escribir	2.2%	0.0%	0.0%	2.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	3.4%	1.5%	4.3%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 82 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO CIVIL GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado Civil	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Soltero	60.1%	100%	60%	54.9%	53.2%	100%	87.5%	63.6%	80.6%	64.3%	51.4%	100%	64.1%	57.4%
Casado	13.1%	0.0%	10%	16.4%	17.9%	0.0%	12.5%	4.5%	6.5%	7.1%	18.9%	0.0%	9.6%	13.8%
Unión Libre	15.1%	0.0%	10%	13.9%	17.9%	0.0%	0.0%	31.8%	6.5%	21.4%	8.1%	0.0%	19.7%	14.4%
Separado	7.0%	0.0%	15%	6.6%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	14.9%	0.0%	5.6%	9.2%
Divorciado	2.9%	0.0%	0.0%	6.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	1.4%	0.0%	0.5%	3.6%
Viudo	1.5%	0.0%	5%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.4%	0.0%	0.5%	1.6%
No aplica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.2%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

**Cuadro No. 83 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 CON ANTECEDENTE DE BÚSQUEDA DE APOYO PARA TRATAMIENTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Búsqueda de Apoyo	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Primera vez en el año	89.5%	100%	85%	96.7%	92.3%	100%	100%	100%	100%	96.4%	81.1%	100%	85.9%	85.9%
Ya había acudido en este año	10.5%	0.0%	15%	3.3%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	18.9%	0.0%	14.1%	14.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 84 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE ACUDE A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Número de veces	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Primera Vez	67.4%	100%	60%	66.4%	21.8%	100%	100%	72.7%	90.3%	85.7%	63.5%	96.6%	79.8%	76.1%
2 a 4	31.2%	0.0%	40.0%	33.6%	75.6%	0.0%	0.0%	22.7%	9.7%	14.3%	33.8%	3.4%	19.7%	22.0%
5 a >	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.5%	2.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 85 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN FORMA DE ACUDIR A TRATAMIENTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Forma que acude al centro	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Voluntariamente	50.4%	50%	80%	71.3%	73.7%	50.0%	75.0%	77.3%	41.9%	32.1%	58.1%	44.8%	40.4%	33.1%
Indicación médica no psiquiátrica	6.2%	0.0%	15%	9.8%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	6.9%	1.5%	12.5%
Indicación médica psiquiátrica	1.0%	50%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	7.1%	2.7%	0.0%	0.0%	1.3%
Lo llevaron amigos o familiares	33.6%	0.0%	5.0%	4.9%	23.1%	50.0%	12.5%	4.5%	0.0%	39.3%	32.4%	6.9%	52.5%	48.5%
Indicación Legal	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	4.1%	3.4%	1.0%	2.0%
Escuela o trabajo	7.1%	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	51.6%	21.4%	0.0%	37.9%	4.5%	2.6%
Otra (s)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 86 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Drogas de inicio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Alcohol	41%	100%	60%	59%	16.7%	50%	50%	81.8%	71.0%	57.1%	39.2%	62.1%	34.8%	39.3%
Marihuana	9.2%	0.0%	0.0%	3.3%	13.5%	50.0%	12.5%	4.5%	0.0%	10.7%	12.2%	6.9%	14.1%	7.2%
Inhalantes	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	3.4%	1.5%	2.3%
Alucinógenos	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Heroína	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opio/Morfina	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cocaína	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	1.5%	0.0%
Tranquilizantes	0.7%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	1.0%	0.7%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	37.9%	0.0%	30.0%	34.4%	37.8%	0.0%	25.0%	13.6%	22.6%	25.0%	40.5%	20.7%	41.4%	43.9%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Pasta Base	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Metanfetamina /Cristal	8.9%	0.0%	10.0%	2.5%	29.5%	0.0%	12.5%	0.0%	6.5%	7.1%	2.7%	3.4%	5.6%	6.2%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 87 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
SEGÚN EDAD DE INICIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
5 a 9	5.8%	0.0%	5.0%	10.7%	1.3%	0.0%	12.5%	0.0%	16.1%	0.0%	5.4%	0.0%	9.6%	4.3%
10 a 14	47.5%	100%	45.0%	45.1%	33.3%	50%	37.5%	59.1%	71%	32.1%	35.1%	51.7%	53.0%	53.1%
15 a 19	33.0%	0.0%	35.0%	36.1%	33.3%	50%	50.0%	36.4%	3.2%	60.7%	43.2%	41.4%	29.3%	30.5%
20 a 24	7.4%	0.0%	5.0%	4.1%	17.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	7.1%	9.5%	3.4%	3.0%	7.9%
25 a 29	3.0%	0.0%	5.0%	1.6%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	1.4%	0.0%	2.0%	3.3%
30 a 34	1.5%	0.0%	5.0%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.5%	0.7%
35 a 39	0.6%	0.0%	0.0%	1.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.5%	0.0%
40 a 44	0.4%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.5%	0.0%
45 a 49	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%
50 a 54	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.5%	0.0%
55 a 59	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
60 a 64	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 a >	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
S/D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 88 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN DROGA DE IMPACTO GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Drogas de impacto	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Alcohol	24.7%	0.0%	30.0%	44.3%	14.1%	0.0%	37.5%	50.0%	58.1%	21.4%	25.7%	51.7%	18.2%	18.4%
Marihuana	12.1%	50.0%	5.0%	5.7%	7.1%	0.0%	25.0%	13.6%	9.7%	28.6%	8.1%	6.9%	18.2%	13.4%
Inhalantes	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.3%
Alucinógenos	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	2.6%
Heroína	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opio/Morfina	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
Cocaína	2.1%	0.0%	0.0%	3.3%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%	0.0%	2.0%	0.7%
Tranquilizantes	2.4%	0.0%	0.0%	6.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	6.8%	0.0%	1.5%	1.0%
Barbitúricos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.2%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%
Anticolinérgicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Tabaco	7.4%	0.0%	0.0%	4.9%	0.6%	0.0%	12.5%	0.0%	6.5%	7.1%	16.2%	10.3%	4.0%	12.8%
Antidepresivos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros Psicotrópicos	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Pasta Base	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Metanfetamina /Cristal	49.0%	50.0%	60.0%	35.2%	71.2%	100.0 %	25.0%	36.4%	25.8%	35.7%	35.1%	27.6%	55.1%	48.9%
Flunitracepam	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Crack	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.0%
Refractil ofteno	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 89.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
 SEGÚN ESTADO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

Estado	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Aguascalientes	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Distrito Federal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	956	2	20	120	135	2	8	22	30	27	70	29	190	301
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	18	0	0	1	13	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	4	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 89.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN ESTADO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Estado	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Sonora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Yucatán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Zacatecas	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Otro País	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 90.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Acatic	5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acatlán de Juárez	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahualulco del Mercado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Amacueca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amatitán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameca	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
San Juanito de Escobedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arandas	40	0	0	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Arenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Atemajac de Brizuela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atengo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atenguillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	16	0	0	3	8	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Atoyac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autlán de Navarro	19	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	1
Ayotlán	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayutla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barca	10	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolaños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Cihuatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán El Grande	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Cocula	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Colotlán	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepción de Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 90.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Cuautilán de García Barragán	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuautla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuquío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapala	10	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Chimaltitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degollado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejutla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etzatlán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Grullo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guachinango	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guadalajara	225	0	0	2	5	0	0	0	0	6	20	0	32	160
Hostotipaquillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejúcar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huerta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ixtlahuacán del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jalostotitlán	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jamay	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Jesús María	7	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jilotlán de los Dolores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jocotepec	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juanacatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juchitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 90.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Lagos de Moreno	13	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa María del Oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mascota	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Mazamitla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mexxicacán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezquitic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mixtlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocotlán	54	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojuelos de Jalisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pihuamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poncitlán	10	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Vallarta	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0
Villa Purificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quitupan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salto	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	12
San Cristóbal de la Barranca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	11	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Julián	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín de Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Miguel el Alto	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 90.4: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Gómez Farías	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San Sebastián del Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa María de los Ángeles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sayula	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Tala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Talpa de Allende	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Tamazula	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapalpa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tecalitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecolotlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenamaxtlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teocaltiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teocuitatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	53	0	0	45	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Tequila	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teuchitlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tizapán el Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlajomulco de Zúñiga	60	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	25	29
San Pedro Tlaquepaque	91	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	53	33
Tolimán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomatlán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tonalá	75	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	28	23	19
Tonaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tonila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totatiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 90.5: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS SEGÚN MUNICIPIO DE CONSUMO DE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	Total	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Municipio	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Tototlán	6	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcacuesco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxcueca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuxpan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Unión de San Antonio	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión de Tula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gabriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Corona	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Yahualica de González Gallo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapopan	87	0	0	1	2	0	0	0	0	1	38	0	20	25
Zapotiltic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotitlán de Vadillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotlanejo	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Ignacio Cerro Gordo	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Municipios de otros Estados	45	0	0	3	22	0	0	0	2	2	4	0	8	4

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 91 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
CON USO DE DROGAS INYECTADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Uso de drogas inyectadas	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	3%	0.0%	5%	2.5%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	3%	3.9%
No	97%	100%	95%	97.5%	96.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9%	100%	97%	96.1%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

**Cuadro No. 92 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
QUE COMPARTE JERINGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Ha compartido jeringas	30	0	1	3	5	0	0	0	0	0	3	0	6	12
Si	80%	0.0%	100%	66.7%	80%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	50%	91.7%
No	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	20%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50%	8.3%
No sabe	3.3%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 93 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
USO DE JERINGA SIN USO PREVIO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Usa jeringa sin uso previo	30	0	1	3	5	0	0	0	0	0	3	0	6	12
Si	36.7%	0.0%	0.0%	33.3%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	33.3%
No	63.3%	0.0%	100%	66.7%	60%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	66.7%	66.7%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

**Cuadro No. 94 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
QUE CONSUME DROGAS COMBINADAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Combina Drogas	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	46.3%	100.0%	80.0%	59.0%	30.1%	50.0%	75.0%	59.1%	51.6%	50.0%	44.6%	27.6%	49.0%	44.9%
No	53.6%	0.0%	20.0%	41.0%	69.9%	50.0%	25.0%	40.9%	48.4%	50.0%	55.4%	72.4%	50.5%	55.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 95 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
QUE HAN CONDUCIDO BAJO EFECTO DE DROGAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Conducción bajo efecto de drogas	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	22.8%	0.0%	10.0%	27%	24.4%	0.0%	12.5%	31.8%	22.6%	32.1%	36.5%	3.4%	22.7%	18.7%
No	75.6%	100%	55%	69.7%	75.0%	100%	87.5%	68.2%	77.4%	67.9%	60.8%	93.1%	76.8%	81.3%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.2%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

**Cuadro No. 96 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
QUE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ASOCIADA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA**

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Padece alguna enfermedad	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
Si	13.6%	50%	0.0%	23.8%	1.3%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	10.7%	20.3%	65.5%	2.5%	19.3%
No	86.4%	50%	100%	76.2%	98.7%	100%	62.5%	100%	100%	89.3%	79.7%	34.5%	97.5%	80.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 97 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS LUGAR DONDE CONSIGUE LA DROGA DE IMPACTO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Lugar donde consigue la droga de impacto	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
En su propia casa	13.8%	0.0%	10.0%	29.5%	3.8%	0.0%	0.0%	40.9%	0.0%	21.4%	12.2%	3.4%	16.2%	12.1%
Se la llevan a su casa	8.5%	0.0%	5.0%	6.6%	5.8%	0.0%	12.5%	0.0%	6.5%	17.9%	6.8%	3.4%	9.6%	11.1%
En casa de un amigo o familiar	12.5%	0.0%	10.0%	17.2%	1.9%	0.0%	0.0%	4.5%	12.9%	14.3%	14.9%	10.3%	22.7%	10.2%
En la calle	28.4%	100.0%	25.0%	13.1%	76.9%	50%	0.0%	36.4%	12.9%	21.4%	20.3%	13.8%	18.7%	21.3%
En antros y bares	3.4%	0.0%	5.0%	4.1%	2.6%	0.0%	12.5%	0.0%	6.5%	0.0%	1.4%	0.0%	4.5%	3.6%
En fiestas y reuniones	6.0%	0.0%	5.0%	8.2%	1.9%	0.0%	25.0%	13.6%	12.9%	3.6%	4.1%	34.5%	6.1%	3.6%
En la escuela	0.5%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.3%
En el trabajo	1.9%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%	3.4%	2.0%	1.6%
En tiendas cercanas a mi casa	16.6%	0.0%	40.0%	17.2%	1.9%	0.0%	0.0%	4.5%	48.4%	14.3%	32.4%	27.6%	15.2%	17.0%
Parques	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.7%
Picaderos	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	37.5%	0.0%	0.0%	7.1%	1.4%	3.4%	2.0%	18.0%
Otro	0.2%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 98 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS
LUGAR DONDE CONSUME GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA

	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Lugar donde consume la droga de impacto	997	2	20	122	156	2	8	22	31	28	74	29	198	305
La tiene en su casa	42.9%	0.0%	60.0%	48.4%	26.9%	50.0%	12.5%	50.0%	45.2%	35.7%	56.8%	24.1%	40.9%	48.5%
En casa de un amigo o familiar	17.3%	0.0%	10.0%	19.7%	7.7%	0.0%	12.5%	4.5%	22.6%	21.4%	17.6%	10.3%	24.2%	18.0%
En la vía pública (calles, parques)	22.8%	100.0%	20.0%	10.7%	57.1%	0.0%	25.0%	31.8%	12.9%	35.7%	2.7%	17.2%	17.2%	18.0%
En antros y bares	4.7%	0.0%	5.0%	7.4%	4.5%	0.0%	12.5%	0.0%	6.5%	0.0%	2.7%	3.4%	5.6%	4.3%
En fiestas y reuniones	7.7%	0.0%	5.0%	10.7%	2.6%	50.0%	25.0%	13.6%	12.9%	0.0%	17.6%	37.9%	5.6%	4.6%
En la escuela	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	2.0%	0.3%
En el trabajo	1.3%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	3.5%	1.3%
En picaderos	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	7.1%	1.4%	3.4%	1.0%	4.9%
Otro	0.2%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No sabe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No responde	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 99.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	246	0	6	54	22	0	3	11	18	6	19	15	36	56
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	58.1%	0.0%	100.0%	68.5%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	33.3%	66.7%	68.4%	40.0%	50.0%	44.6%
Menor efecto que antes	54.5%	0.0%	66.7%	57.4%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	44.4%	83.3%	63.2%	33.3%	47.2%	42.9%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	53.7%	0.0%	50.0%	57.4%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	33.3%	66.7%	68.4%	33.3%	47.2%	44.6%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	49.2%	0.0%	83.3%	48.1%	95.5%	0.0%	33.3%	45.5%	55.6%	33.3%	73.7%	33.3%	33.3%	35.7%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	42.3%	0.0%	16.7%	40.7%	95.5%	0.0%	0.0%	45.5%	44.4%	50.0%	57.9%	26.7%	41.7%	25.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 99.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	246	0	6	54	22	0	3	11	18	6	19	15	36	56
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL USO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	51.6%	0.0%	66.7%	38.9%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	44.4%	83.3%	73.7%	53.3%	44.4%	41.1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	51.6%	0.0%	66.7%	53.7%	95.5%	0.0%	0.0%	54.5%	22.2%	66.7%	52.6%	40%	50%	44.6%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	53.7%	0.0%	100.0%	50.0%	95.5%	0.0%	33.3%	45.5%	33.3%	100.0%	84.2%	33.3%	38.9%	44.6%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	40.2%	0.0%	33.3%	38.9%	95.5%	0.0%	0.0%	45.5%	33.3%	33.3%	52.6%	20%	36.1%	28.6%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 99.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
ALCOHOL	246	0	6	54	22	0	3	11	18	6	19	15	36	56
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	23.6%	0.0%	33.3%	3.7%	95.5%	0.0%	0.0%	45.5%	22.2%	16.7%	21.1%	13.3%	19.4%	17.9%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	43.1%	0.0%	50.0%	46.3%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	22.2%	33.3%	52.6%	46.7%	30.6%	28.6%
Descuido de actividades	49.2%	0.0%	50.0%	48.1%	95.5%	0.0%	0.0%	54.5%	22.2%	50%	68.4%	40%	38.9%	44.6%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	25.6%	0.0%	33.3%	13.0%	90.9%	0.0%	0.0%	36.4%	11.1%	33.3%	36.8%	6.7%	22.2%	17.9%
Continuó usando a pesar de esos problemas	28.9%	0.0%	16.7%	16.7%	95.5%	0.0%	0.0%	36.4%	22.2%	33.3%	42.1%	13.3%	30.6%	16.1%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	55.7%	0.0%	83.3%	57.4%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	33.3%	83.3%	73.7%	33.3%	38.9%	51.8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	52.4%	0.0%	83.3%	55.6%	95.5%	0.0%	33.3%	54.5%	33.3%	66.7%	68.4%	33.3%	36.1%	44.6%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 100 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS														
EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL ALCOHOL, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
ALCOHOL	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio droga de impacto	246	0	6	54	22	0	3	11	18	6	19	15	36	56
5 a 9	5.7%	0.0%	0.0%	7.4%		0.0%			22.2%		5.3%		8.3%	3.6%
10 a 14	37.4%	0.0%	16.7%	44.4%	9.1%	0.0%	33.3%	54.5%	61.1%	16.7%	26.3%	60%	38.9%	32.1%
15 a 19	37.8%	0.0%	66.7%	33.3%	36.4%	0.0%	66.7%	36.4%	11.1%	66.7%	36.8%	33.3%	41.7%	42.9%
20 a 24	8.1%	0.0%	0.0%	3.7%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	16.7%	10.5%	6.7%	2.8%	10.7%
25 a 29	2.8%	0.0%	0.0%	3.7%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%
30 a 34	3.7%	0.0%	16.7%		18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	3.6%
35 a 39	1.2%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%
40 a 44	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%
45 a 49	1.2%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%
50 a 54	0.4%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
55 a 59	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60 a 64	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 a >	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
S/D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 101.1: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	121	1	1	7	11	0	2	3	3	8	6	2	36	41
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	52.1%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	62.5%	50%	100%	38.9%	58.5%
Menor efecto que antes	51.2%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	37.5%	50%	100%	36.1%	63.4%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	47.9%	100%	100.0%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	37.5%	50%	100%	38.9%	51.2%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	37.2%	100%	0.0%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	37.5%	33.3%	50%	22.2%	41.5%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	36.4%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	50.0%	0.0%	33.3%	37.5%	33.3%	50%	22.2%	34.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 101.2: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	121	1	1	7	11	0	2	3	3	8	6	2	36	41
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	53.7%	100%	0.0%	57.1%	90.9%	0.0%	50%	33.3%	33.3%	75%	16.7%	100%	36.1%	61.0%
Ha consumido cantidad y tiempo del que pensaba	42.1%	100%	100.0%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	37.5%	66.7%	0.0%	22.2%	48.8%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	38.8%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	50%	33.3%	33.3%	50%	33.3%	0.0%	25.0%	36.6%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	34.7%	0.0%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	50%	50.0%	0.0%	22.2%	29.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 101.3: PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MARIHUANA	121	1	1	7	11	0	2	3	3	8	6	2	36	41
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	28.9%	100%	0.0%	0.0%	90.9%	0.0%	50%	0.0%	0.0%	37.5%	16.7%	0.0%	22.2%	26.8%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	32.2%	100%	100%	14.3%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%	22.2%	36.6%
Descuido de actividades	49.6%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50%	66.7%	100%	25.0%	65.9%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	24.0%	100%	0.0%	14.3%	90.9%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	50%	8.3%	19.5%
Continuó usando a pesar de esos problemas	29.8%	100%	0.0%	14.3%	90.9%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	100%	16.7%	24.4%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	52.1%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	50.0%	100%	33.3%	50.0%	66.7%	100%	25.0%	61.0%
Continúa usando a pesar de esos problemas	53.7%	100%	100%	28.6%	90.9%	0.0%	50.0%	100%	33.3%	50.0%	66.7%	100%	25.0%	65.9%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 102 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS														
EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA MARIHUANA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
MARIHUANA	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio droga de impacto	121	1	1	7	11	0	2	3	3	8	6	2	36	41
5 a 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 a 14	47.9%	100%	100%	28.6%	0.0%	0.0%	50%	66.7%	100%	12.5%	66.7%	50%	58.3%	51.2%
15 a 19	39.7%	0.0%	0.0%	42.9%	36.4%	0.0%	50%	33.3%	0.0%	87.5%	16.7%		36.1%	43.9%
20 a 24	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	50%	5.6%	2.4%
25 a 29	3.3%	0.0%	0.0%	14.3%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30 a 34	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
35 a 39	2.5%	0.0%	0.0%	14.3%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
40 a 44	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45 a 49	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50 a 54	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
55 a 59	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60 a 64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 a >	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
S/D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 103.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%
Menor efecto que antes	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 103.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	100%				100%								100%	100%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	100%				100%								100%	100%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	100%				100%								100%	100%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	100%				100%								100%	100%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 103.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
INHALANTES	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	100%				100%								100%	100%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	100%				100%								100%	100%
Descuido de actividades	100%				100%								100%	100%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	100%				100%								100%	100%
Continuó usando a pesar de esos problemas	100%				100%								100%	100%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	100%				100%								100%	100%
Continúa usando a pesar de esos problemas	100%				100%								100%	100%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 104 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LOS INHALANTES, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio droga de impacto	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5 a 9														
10 a 14	66.7%												100%	100%
15 a 19	33.3%				100%									
20 a 24														
25 a 29														
30 a 34														
35 a 39														
40 a 44														
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 105.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	21	0	0	4	6	0	0	0	0	0	5	0	4	2
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	71.4%			50.0%	100%						80.0%		50.0%	50.0%
Menor efecto que antes	81.0%			50.0%	100%						100%		75.0%	50.0%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	81.0%			50.0%	100%						100%		75.0%	50.0%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	81.0%			75.0%	100%						100%		50.0%	50.0%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	71.4%			75.0%	100%						80.0%		50.0%	

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 105.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	21	0	0	4	6	0	0	0	0	0	5	0	4	2
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	81%			75.0%	100%						80%		50%	100%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	76.2%			75.0%	100%						80%		50%	50%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	90.5%			100%	100%						100%		75%	50%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	76.2%			50%	100%						80%		75%	50%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 105.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
COCAÍNA	21	0	0	4	6	0	0	0	0	0	5	0	4	2
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	57.1%				100%						60%		75.0%	
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	81.0%			100%	100%						80%		50%	50%
Descuido de actividades	76.2%			75.0%	100%						80%		50%	50%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	61.9%			75.0%	100%						40%		50%	
Continuó usando a pesar de esos problemas	61.9%			75.0%	100%						40%		50%	
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	81.0%			75.0%	100%						80%		75%	50%
Continúa usando a pesar de esos problemas	85.7%			75.0%	100%						100%		75%	50%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 106 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES LA COCAÍNA, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio droga de impacto	21	0	0	4	6	0	0	0	0	0	5	0	4	2
5 a 9														
10 a 14	23.8%				16.7%						40%		25%	50%
15 a 19	23.8%				16.7%						20%		50%	50%
20 a 24	28.6%			50%	50%								25%	
25 a 29	14.3%			25%	16.7%						20%			
30 a 34														
35 a 39	9.5%			25%							20%			
40 a 44														
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														
S/D														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 107.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	74	0	0	6	1	0	1	0	2	2	12	3	8	39
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	47.3%			33.3%	100%						33.3%	100%	62.5%	51.3%
Menor efecto que antes	44.6%				100%						16.7%	100%	50%	59.0%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	40.5%				100%						16.7%	100%	50%	51.3%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	47.3%			33.3%	100%						41.7%	100%	62.5%	48.7%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	35.1%				100%						41.7%	33.3%	37.5%	41%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 107.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	74	0	0	6	1	0	1	0	2	2	12	3	8	39
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	33.8%				100%						16.7%	100%	50%	38.5%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	36.5%			16.7%	100%						16.7%	66.7%	25%	48.7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	20.3%									50%	41.7%		37.5%	15.4%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	13.5%									50%	33.3%		12.5%	10.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 107.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	74	0	0	6	1	0	1	0	2	2	12	3	8	39
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	33.8%				100%						16.7%	100%	50.0%	38.5%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	36.5%			16.7%	100%						16.7%	66.7%	25.0%	48.7%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	20.3%									50%	41.7%		37.5%	15.4%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	13.5%									50%	33.3%		12.5%	10.3%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 107.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
TABACO	74	0	0	6	1	0	1	0	2	2	12	3	8	39
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	17.6%										16.7%		12.5%	25.6%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	9.5%										25%		12.5%	7.7%
Descuido de actividades	9.5%										8.3%		12.5%	12.8%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	14.9%										16.7%		25.0%	17.9%
Continuó usando a pesar de esos problemas	13.5%										16.7%		25.0%	15.4%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	16.2%								100%		16.7%		12.5%	17.9%
Continúa usando a pesar de esos problemas	16.2%										16.7%		25.0%	20.5%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 108 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO ES EL TABACO, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	74	0	0	6	1	0	1	0	2	2	12	3	8	39
5 a 9	1.4%													2.6%
10 a 14	44.6%			66.7%	100%				100%	100%	25%		37.5%	46.2%
15 a 19	39.2%			16.7%			100%				58.3%	66.7%	50%	35.9%
20 a 24	9.5%			16.7%							8.3%		12.5%	10.3%
25 a 29	4.1%										8.3%			5.1%
30 a 34														
35 a 39														
40 a 44	1.4%											33.3%		
45 a 49														
50 a 54														
55 a 59														
60 a 64														
65 a >														
S/D														

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 109.1 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	489	1	12	43	111	2	2	8	8	10	26	8	109	149
TOLERANCIA														
Usa mayor cantidad	76.9%		83.3%	67.4%	98.2%	50.0%	100%	87.5%	100%	100%	73.1%	75.0%	66.1%	69.1%
Menor efecto que antes	75.3%	100%	41.7%	60.5%	97.3%	50.0%	50%	87.5%	75%	40%	76.9%	75.0%	69.7%	71.8%
Necesita mayor dosis para lograr el mismo efecto	72.8%	100%	41.7%	58.1%	98.2%	50%	50%	87.5%	75%	50%	73.1%	87.5%	60.6%	69.8%
COMPULSIÓN														
Aumenta el deseo de no consumir y no pudo evitarlo	72.8%	100%	75.0%	76.7%	98.2%	50%	100%	75.0%	75%	70%	73.1%	75%	56%	64.4%
Deseo fuerte de consumir que no puede pensar en nada más	61.3%	100%	41.7%	46.5%	96.4%	50%		75.0%	25%	40%	57.7%	62.5%	47.7%	55%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 109.2 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	489	1	12	43	111	2	2	8	8	10	26	8	109	149
DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL CONSUMO														
Ha querido suspender o disminuir el consumo	75.9%	100%	100%	76.7%	94.6%	100%	50%	87.5%	100%	60%	76.9%	87.5%	60.6%	69.1%
Ha consumido mayor cantidad y por más tiempo del que se proponía	70.8%	100%	33.3%	65.1%	93.7%			87.5%	75%	30%	61.5%	75.0%	65.1%	67.1%
ABSTINENCIA														
Malestar por suspender	80.0%	100%	91.7%	60.5%	98.2%	100%	100%	75.0%	75%	90%	76.9%	75.0%	76.1%	73.8%
Consumo de otra sustancia para evitar el malestar	70.1%	100%	33.3%	46.5%	96.4%			75.0%	75%	40%	65.4%	62.5%	67.9%	66.4%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 109.3 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS CON CRITERIOS DE DEPENDENCIA CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
MET-ANFETAMINAS	489	1	12	43	111	2	2	8	8	10	26	8	109	149
REDUCCIÓN PROGRESIVA														
Mayor tiempo en conseguir	55.2%	100%	50.0%	16.3%	93.7%	50%	50.0%	100%	50%	60%	53.8%		48.6%	43.6%
Mayor tiempo de uso y/o recuperación	69.1%	100%	33.3%	51.2%	96.4%	100%		100%	75%	50%	69.2%	37.5%	61.5%	63.8%
Descuido de actividades	80.6%	100%	50.0%	88.4%	98.2%	100%		100%	50%	50%	80.8%	87.5%	67.0%	80.5%
USO PERSISTENTE														
Problemas de salud, sobredosis	49.7%	100%	50%	23.3%	89.2%	100%	50%	37.5%	75%	60%	38.5%	12.5%	37.6%	38.3%
Continuó usando a pesar de esos problemas	54.2%	100%	50%	27.9%	91%	100%	50%	37.5%	75%	80%	61.5%	12.5%	42.2%	41.6%
Ha tenido problemas psicológicos o sociales	84.0%	100%	91.7%	69.8%	98.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	78.0%	75.8%
Continúa usando a pesar de esos problemas	82.8%	100%	100%	67.4%	98.2%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2%	75%	78.9%	71.8%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 110 PACIENTES DEL SEXO FEMENINO ATENDIDOS POR CONSUMO DE DROGAS														
EDAD DE INICIO CUANDO LA DROGA DE IMPACTO SON LAS METANFETAMINAS, GENERAL Y POR REGIÓN SANITARIA														
	General	RS-I	RS-II	RS-III	RS-IV	RS-V	RS-VI	RS-VII	RS-VIII	RS-IX	RS-X	RS-XI	RS-XII	RS-XIII
Edad de Inicio	489	1	12	43	111	2	2	8	8	10	26	8	109	149
5 a 9	0.2%													0.7%
10 a 14	13.5%			11.6%	5.4%	50%	50%	37.5%	25%	20%	7.7%	12.5%	12.8%	19.5%
15 a 19	37.4%	100%	66.7%	37.2%	37.8%	50%	50%	50%	25%	40%	38.5%	62.5%	37.6%	32.2%
20 a 24	21.5%		8.3%	23.3%	30.6%			12.5%		20%	26.9%	12.5%	16.5%	20.8%
25 a 29	11.7%		16.7%	11.6%	10.8%				25%	10%	7.7%		16.5%	10.1%
30 a 34	8.4%			9.3%	11.7%						11.5%	12.5%	9.2%	6.7%
35 a 39	4.3%			4.7%	1.8%				25%		3.8%		2.8%	7.4%
40 a 44	1.2%		8.3%	2.3%	0.9%					10%				1.3%
45 a 49	1.2%												4.6%	0.7%
50 a 54	0.2%				0.9%									
55 a 59	0.2%													0.7%
60 a 64														
65 a >														
S/D														

INDICADOR SERVICIO MÉDICO FORENSE

En el año 2017 se modificó las cédulas de los diferentes indicadores del SISVEA, a partir del año 2018 se presentará con información en cuadros, donde se describirá el contenido de la cédula lo cual abarca lo siguiente:

La información se obtiene de tres fuentes:

Libros de Trabajo Social

Libros de registro de las autopsias por parte del médico forense

Las alcoholimetrías del informe del Instituto de Ciencias Forenses

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

La fecha de elaboración:

La fecha de nacimiento del cadáver:

Edad del cadáver al perder la vida

Nombre del cadáver y si no se conoce o tiene registro se dejará como anónimo.

Sexo:

Femenino: Se pregunta si falleció estando en estado grávido

La Entidad y el Municipio de Residencia.

DATOS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE

Toda la información se obtiene del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ubicado en San Pedro Tlaquepaque Jalisco.

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

Fecha de defunción:

Causa de la Muerte:

Causa directa y básica de la muerte: para ello se utilizó la codificación del CIE 10

Lugar en el que ocurrió la muerte

Se toman los siguientes lugares:

En tránsito

Hogar

Vía Pública

Escuela
Sitio de Recreación
Trabajo
Otro
Se Desconoce

El **producto de la defunción** se toma en cuatro rubros:

Accidente
Homicidio
Suicidio
Muerte no violenta

DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

Se obtiene la información si la muerte se presentó bajo el efecto de alguna sustancia droga y/o psicotrópico
Si es afirmativa se buscan 5 principales sustancias y si hubo confirmación laboratorial de las drogas encontradas.
Se describirá el número total de muertes y se detallarán las muertes producidas bajo el efecto de alguna droga.

Los criterios para llenar su información en la cédula son en cadáveres mayores de 5 años y con información completa.

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 1 DISTRIBUCIÓN GENERAL SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN		
Producto	Número	Porcentaje
Accidente	941	27.6
Homicidio	1,694	49.7
Suicidio	405	11.9
No violenta	366	10.8
Total	3,406	100%

Cuadro No. 2 INFORMACIÓN COMPLETA DEL CADÁVER SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Anónimo	3,406	941	1,694	405	366
Si	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 3 EDAD DE FALLECIMIENTO SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	3,406	941	1,694	405	366
5 a 9	0.5%	1.4%	0.1%	0.0%	0.8%
10 a 14	0.9%	1.7%	0.4%	1.2%	0.3%
15 a 19	6.4%	9.2%	5.8%	6.7%	1.6%
20 a 24	12.7%	10.6%	15.5%	13.6%	4.1%
25 a 29	14.5%	10.1%	18.8%	17.5%	3.0%
30 a 34	12.3%	9.1%	15.1%	14.8%	4.6%
35 a 39	11.3%	8.2%	13.4%	11.9%	8.7%
40 a 44	9.1%	7.4%	10.2%	9.4%	7.9%
45 a 49	7.5%	6.9%	7.3%	8.4%	9.0%
50 a 54	6.0%	6.3%	5.3%	6.2%	8.2%
55 a 59	5.0%	6.6%	3.2%	2.0%	12.8%
60 a 64	3.7%	5.5%	1.7%	3.7%	8.2%
65 a 69	2.7%	3.4%	1.1%	3.7%	7.1%
70 a >	7.4%	13.5%	2.1%	1.0%	23.5%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 4 GÉNERO DEL CADÁVER POR PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Sexo	3,406	941	1,694	405	366
Masculino	84.5%	80.4%	89.0%	80.7%	78.4%
Femenino	15.5%	19.6%	11.0%	19.3%	21.6%

Cuadro No. 5 CADÁVERES DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO Y PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	528	184	187	78	79
Si	0.9%	0.0%	2.1%	0.0%	1.3%
No	99.1%	100.0%	97.9%	100.0%	98.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 6.1 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Aguascalientes	7	1	6	0	0
Baja California	4	3	1	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0
Colima	6	2	1	0	3
Chiapas	5	5	0	0	0
Chihuahua	2	0	0	0	2
Ciudad de México	4	2	1	0	1
Durango	3	1	0	0	2
Guanajuato	9	3	4	0	2
Guerrero	2	1	1	0	0
Hidalgo	2	2	0	0	0
Jalisco	3,277	884	1,646	402	345
México	17	7	8	0	2
Michoacán	20	9	11	0	0
Morelos	0	0	0	0	0
Nayarit	9	6	2	0	1
Nuevo León	1	1	0	0	0
Oaxaca	1	1	0	0	0
Puebla	2	0	1	1	0
Querétaro	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	3	1	1	0	1
Sinaloa	3	1	2	0	0
Sonora	4	4	0	0	0
Tabasco	1	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 6.2 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Tamaulipas	0	0	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0
Veracruz	4	2	2	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0
Zacatecas	9	2	5	0	2
Otro país	11	3	1	2	5

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Acatic	5	2	3	0	0
Acatlán de Juárez	12	3	8	0	1
Ahualulco del Mercado	3	2	1	0	0
Amacueca	1	1	0	0	0
Amatitán	1	1	0	0	0
Ameca	2	1	1	0	0
San Juanito de Escobedo	0	0	0	0	0
Arandas	6	4	2	0	0
Arenal	5	1	0	2	2
Atemajac de Brizuela	3	2	1	0	0
Atengo	0	0	0	0	0
Atenguillo	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	9	5	2	0	2
Atoyac	1	0	0	0	1
Autlán de Navarro	5	3	0	0	2
Ayotlán	1	1	0	0	0
Ayutla	1	1	0	0	0
Barca	3	2	1	0	0
Bolaños	2	2	0	0	0
Cabo Corrientes	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	0	0	0	0	0
Cihuatlán	2	1	1	0	0
Zapotlán El Grande	3	3	0	0	0
Cocula	3	1	2	0	0
Colotlán	1	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Concepción de Buenos Aires	0	0	0	0	0
Cuautitlán de García Barragán	0	0	0	0	0
Cuautla	0	0	0	0	0
Cuquío	3	2	0	0	1
Chapala	52	25	20	1	6
Chimaltitlán	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	1	0	1	0	0
Degollado	1	0	1	0	0
Ejutla	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	1	0	0	0
Etzatlán	1	0	1	0	0
El Grullo	0	0	0	0	0
Guachinango	0	0	0	0	0
Guadalajara	815	170	442	103	100
Hostotipaquillo	0	0	0	0	0
Huejúcar	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	0	0	0	0	0
La Huerta	2	2	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	36	10	21	2	3
Ixtlahuacán del Río	19	10	3	2	4
Jalostotitlán	2	1	1	0	0
Jamay	2	2	0	0	0
Jesús María	0	0	0	0	0
Jilotlán de los Dolores	0	0	0	0	0
Jocotepec	42	15	16	8	3
Juanacatlán	21	7	11	2	1
Juchitlán	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Lagos de Moreno	5	2	1	1	1
El Limón	1	1	0	0	0
Magdalena	0	0	0	0	0
Santa María del Oro	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	0	0	0	0	0
Mascota	0	0	0	0	0
Mazamitla	6	6	0	0	0
Mexticacán	0	0	0	0	0
Mezquitic	2	0	1	1	0
Mixtlán	0	0	0	0	0
Ocotlán	12	8	1	3	0
Ojuelos de Jalisco	1	1	0	0	0
Pihuamo	0	0	0	0	0
Poncitlán	3	1	2	0	0
Puerto Vallarta	8	6	1	0	1
Villa Purificación	0	0	0	0	0
Quitupan	0	0	0	0	0
El Salto	203	50	115	19	19
San Cristóbal de la Barranca	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	0	0	0	0	0
San Julián	0	0	0	0	0
San Marcos	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	0	0	0	0	0
San Martín de Hidalgo	1	1	0	0	0
San Miguel el Alto	2	1	0	1	0
Gómez Farías	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
San Sebastián del Oeste	1	0	0	1	0
Santa María de los Ángeles	0	0	0	0	0
Sayula	4	3	1	0	0
Tala	11	6	4	1	0
Talpa de Allende	1	0	1	0	0
Tamazula de Gordiano	10	8	1	1	0
Tapalpa	1	0	0	0	1
Tecalitlán	3	1	0	1	1
Tecolotlán	1	1	0	0	0
Techaluta de Montenegro	0	0	0	0	0
Tenamaxtlán	0	0	0	0	0
Teocaltiche	1	0	1	0	0
Teocuitatlán de Corona	2	0	2	0	0
Tepatitlán de Morelos	12	7	4	0	1
Tequila	10	7	1	1	1
Teuchitlán	0	0	0	0	0
Tizapán el Alto	0	0	0	0	0
Tlajomulco de Zúñiga	426	96	234	52	44
Tlaquepaque	519	96	311	65	47
Tolimán	1	0	1	0	0
Tomatlán	0	0	0	0	0
Tonalá	299	71	174	34	20
Tonaya	0	0	0	0	0
Tonila	0	0	0	0	0
Totatiche	1	0	1	0	0
Tototlán	2	1	1	0	0
Tuxcacuesco	1	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 7.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVERSEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,406	941	1,694	405	366
Tuxcueca	4	2	1	1	0
Tuxpan	0	0	0	0	0
Unión de San Antonio	0	0	0	0	0
Unión de Tula	1	1	0	0	0
Valle de Guadalupe	1	1	0	0	0
Valle de Juárez	0	0	0	0	0
San Gabriel	0	0	0	0	0
Villa Corona	11	5	2	2	2
Villa Guerrero	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	1	1	0	0	0
Cañadas de Obregón	0	0	0	0	0
Yahualica de González Gallo	1	1	0	0	0
Zacoalco de Torres	3	1	2	0	0
Zapopan	595	189	239	93	74
Zapotiltic	1	1	0	0	0
Zapotitlán de Vadillo	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	3	2	0	1	0
Zapotlanejo	37	24	4	4	5
San Ignacio Cerro Gordo	0	0	0	0	0
Otros Estados o País	131	58	48	3	22

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO

Cuadro No. 8.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
T71	Asfixia	701	99	278	323	1
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	569	165	401	3	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	480	325	152	2	1
S01	Herida de la cabeza	452	14	423	15	0
S21	Herida del tórax	233	32	201	0	0
I21	Infarto agudo del miocardio	134	4	0	0	130
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	105	19	86	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	71	4	1	0	66
S11	Herida del cuello	54	1	51	2	0
I60	Hemorragia subaracnoidea	47	29	12	0	6
J81	Edema pulmonar	46	11	1	7	27
S20	Traumatismo superficial del tórax	44	37	7	0	0
S06	Traumatismo intracraneal	39	25	14	0	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	35	28	7	0	0
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	30	5	0	25	0
T06	Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	30	27	3	0	0
K25	Úlcera gástrica	26	0	0	0	26
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	21	5	0	0	16
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	15	11	4	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 8.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	15	0	0	15	0
A41	Otras Sepsis	14	2	2	0	10
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	13	0	0	0	13
I61	Hemorragia intraencefálica	13	6	2	0	5
S30	Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	13	7	6	0	0
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	12	12	0	0	0
X93	Agresión con disparo de arma corta	10	0	10	0	0
I26	Embolia pulmonar	9	0	1	0	8
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	9	0	0	0	9
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	9	0	9	0	0
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	9	9	0	0	0
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	8	0	0	0	8
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	7	4	3	0	0
G93	Otros trastornos del encéfalo	6	3	0	0	3
S08	Amputación traumática de parte de la cabeza	6	2	3	1	0
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	5	5	0	0	0
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	5	0	5	0	0
K65	Peritonitis	4	0	0	0	4
R57	Choque, no clasificado en otra parte	4	1	0	2	1
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	4	4	0	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	4	0	0	4	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 8.3 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
I50	Insuficiencia cardíaca	3	0	0	0	3
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	3	0	1	0	2
K57	Enfermedad diverticular del intestino	3	0	0	0	3
K85	Pancreatitis aguda	3	0	0	0	3
S12	Fractura del cuello	3	3	0	0	0
S71	Herida de la cadera y del muslo	3	1	2	0	0
T51	Efecto tóxico del alcohol	3	3	0	0	0
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	3	3	0	0	0
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	3	3	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	3	0	0	3	0
X99	Agresión con objeto cortante	3	0	3	0	0
A87	Meningitis viral	2	1	0	0	1
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2	0	0	0	2
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	2	1	0	0	1
I71	Aneurisma y disección aórticos	2	1	0	0	1
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	2	2	0	0	0
S15	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello	2	1	1	0	0
S75	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo	2	2	0	0	0
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	2	2	0	0	0
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	2	2	0	0	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	2	2	0	0	0
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	2	2	0	0	0
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	0	0	0	1
C71	Tumor maligno del encéfalo	1	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 8.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
D07	Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados	1	0	0	0	1
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	0	0	0	1
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	1	0	0	0	1
I31	Otras enfermedades del pericardio	1	1	0	0	0
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	1	0	0	0	1
I46	Paro cardíaco	1	0	0	0	1
I63	Infarto cerebral	1	0	0	0	1
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	1	0	0	0	1
I74	Embolia y trombosis arteriales	1	0	0	0	1
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	1	0	0	1	0
K22	Otras enfermedades del esófago	1	0	0	0	1
K35	Apendicitis aguda	1	0	0	0	1
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	1	0	0	0	1
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1	0	0	0	1
N18	Enfermedad renal crónica	1	0	0	0	1
R65	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica	1	0	0	0	1
S02	Fractura de huesos del cráneo y de la cara	1	0	1	0	0
S07	Traumatismo por aplastamiento de la cabeza	1	1	0	0	0
S13	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello	1	1	0	0	0
S29	Otros traumatismos y los no especificados del tórax	1	0	1	0	0
S32	Fractura de la columna lumbar y de la pelvis	1	1	0	0	0
S36	Traumatismo de órganos intraabdominales	1	1	0	0	0
S81	Herida de la pierna	1	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 8.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
		3,406	941	1,694	405	366
T00	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	1	1	0	0	0
T07	Traumatismos múltiples, no especificados	1	1	0	0	0
T54	Efecto tóxico de sustancias corrosivas	1	0	0	1	0
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	1	1	0	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	1	0	0	0
V72	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1	1	0	0	0
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	1	1	0	0	0
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	1	0	0	0
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	1	0	0	0
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	1	1	0	0	0
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	1	0	0	1	0
X86	Agresión con sustancia corrosiva	1	0	1	0	0
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	1	0	1	0	0
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	1	1	0	0	0

**Cuadro No. 9.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
X93	Agresión con disparo de arma corta	1011	0	1011	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	309	0	0	309	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	276	273	0	0	3
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	261	0	261	0	0
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	245	5	240	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	179	179	0	0	0
X99	Agresión con objeto cortante	139	0	138	1	0
I21	Infarto agudo del miocardio	126	0	0	0	126
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	116	116	0	0	0
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	74	74	0	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	70	2	0	2	66
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	52	52	0	0	0
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	38	0	0	38	0
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	26	26	0	0	0
J81	Edema pulmonar	24	2	0	0	22
K25	Úlcera gástrica	22	0	0	0	22
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	21	4	0	17	0
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	19	4	1	0	14
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	18	16	2	0	0
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	16	16	0	0	0

**Cuadro No. 9.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	15	15	0	0	0
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	14	14	0	0	0
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	13	0	0	0	13
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	13	0	0	0	13
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	13	12	0	0	1
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	12	0	12	0	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	11	8	2	0	1
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	11	9	0	2	0
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	11	0	0	11	0
A41	Otras Sepsis	10	0	0	0	10
I26	Embolia pulmonar	10	0	0	0	10
T71	Asfixia	10	2	5	3	0
W10	Caída en o desde escalera o escalones	10	10	0	0	0
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	9	0	0	0	9
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	9	9	0	0	0
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	8	2	6	0	0
I60	Hemorragia subaracnoidea	7	1	0	0	6
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	7	7	0	0	0
W78	Inhalación de contenidos gástricos	7	6	0	0	1
W18	Otras caídas en el mismo nivel	6	6	0	0	0
W19	Caída no especificada	6	6	0	0	0
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	6	6	0	0	0
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	6	6	0	0	0
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	6	1	0	5	0
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	5	5	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 9.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	5	0	0	5	0
I61	Hemorragia intraencefálica	4	0	0	0	4
K57	Enfermedad diverticular del intestino	4	0	0	0	4
S01	Herida de la cabeza	4	0	4	0	0
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	4	4	0	0	0
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	4	0	0	4	0
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	4	0	1	3	0
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	4	0	4	0	0
G93	Otros trastornos del encéfalo	3	2	0	0	1
I50	Insuficiencia cardíaca	3	0	0	0	3
K65	Peritonitis	3	0	0	0	3
K85	Pancreatitis aguda	3	0	0	0	3
N18	Enfermedad renal crónica	3	1	0	0	2
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	3	3	0	0	0
T51	Efecto tóxico del alcohol	3	3	0	0	0
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	3	3	0	0	0
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	3	3	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	3	0	0	3	0
A87	Meningitis viral	2	1	0	0	1
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2	0	0	0	2
I71	Aneurisma y disección aórticos	2	0	0	0	2
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	2	0	0	0	2
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	2	0	0	0	2
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	2	2	0	0	0
W39	Explosión de fuegos artificiales	2	2	0	0	0
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	2	0	0	0
Y09	Agresión por medios no especificados	2	0	2	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

Cuadro No. 9.4 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1	0	0	0	1
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	0	0	0	1
C71	Tumor maligno del encéfalo	1	0	0	0	1
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	0	0	0	1
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	1	0	0	0	1
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	1	0	0	0	1
I10	Hipertensión esencial (primaria)	1	0	0	0	1
I31	Otras enfermedades del pericardio	1	1	0	0	0
I46	Paro cardíaco	1	0	0	0	1
I63	Infarto cerebral	1	0	0	0	1
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	1	0	0	0	1
I74	Embolia y trombosis arteriales	1	0	0	0	1
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	1	0	0	1	0
K22	Otras enfermedades del esófago	1	0	0	0	1
K35	Apendicitis aguda	1	0	0	0	1
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	1	0	0	0	1
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0	0	0	1
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	1	0	0	0	1
R16	Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	1
R57	Choque, no clasificado en otra parte	1	0	0	0	1
R65	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica	1	0	0	0	1
S06	Traumatismo intracraneal	1	0	1	0	0
S14	Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello	1	1	0	0	0
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	1	0	1	0	0
T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello	1	1	0	0	0
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	1	1	0	0	0
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1	1	0	0	0
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0

**Cuadro No. 9.5 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,406	Accidente 941	Homicidio 1,694	Suicidio 405	No Violenta 366
V21	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	0	0	0
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0
V34	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	1	0	0	0	1
V72	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1	1	0	0	0
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1	1	0	0	0
W03	Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona	1	1	0	0	0
W29	Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor	1	1	0	0	0
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	1	1	0	0	0
W35	Explosión y rotura de caldera	1	1	0	0	0
W54	Mordedura o ataque de perro	1	1	0	0	0
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	1	0	0	0
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	1	1	0	0	0
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	1	1	0	0	0
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	0	0	1	0
X79	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	1	1	0	0	0
X90	Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas	1	0	1	0	0
Y01	Agresión por empujón desde un lugar elevado	1	0	1	0	0
Y04	Agresión con fuerza corporal	1	0	1	0	0
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	1	1	0	0	0
Y26	Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada	1	1	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 10 LUGAR DONDE OCURRIÓ DE LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre la muerte	3,406	941	1,694	405	366
En tránsito	15.1%	54.4%	0.1%	0.5%	0.0%
Hogar	20.9%	11.6%	9.7%	77.0%	34.7%
Vía Pública	42.8%	6.4%	76.9%	4.4%	21.6%
Escuela	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.3%
Sitio de recreación	0.3%	0.6%	0.2%	0.0%	0.3%
Trabajo	1.1%	3.3%	0.1%	0.0%	0.8%
Otro	19.6%	23.7%	12.9%	17.8%	42.3%
Se desconoce	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 11 MES EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	3,406	941	1,694	405	366
Enero	7.3%	7.5%	7.0%	6.7%	9.0%
Febrero	7.5%	9.0%	6.7%	8.6%	6.0%
Marzo	8.8%	6.6%	10.2%	8.6%	8.7%
Abril	8.7%	7.1%	9.9%	8.1%	8.2%
Mayo	9.1%	8.6%	9.6%	0..%	6.6%
Junio	8.6%	9.2%	8.1%	7.7%	10.7%
Julio	8.6%	8.8%	8.5%	8.1%	9.0%
Agosto	8.2%	8.9%	7.9%	9.1%	7.1%
Septiembre	8.1%	8.1%	7.4%	10.4%	8.5%
Octubre	8.7%	8.7%	9.4%	6.7%	7.4%
Noviembre	7.9%	8.3%	7.6%	7.9%	8.7%
Diciembre	8.4%	9.0%	7.8%	7.7%	10.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 12 NÚMERO DE CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS POR PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
Muerte Bajo Drogas	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Si	395	119	202	45	29
No	3011	822	1492	360	337
Total	3406	941	1694	405	366

Cuadro No. 13 CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Muerte Bajo Drogas	395	119	202	45	29
Si	11.6%	12.6%	11.9%	11.1%	7.9%
No	88.4%	87.4%	88.1%	88.9%	92.1%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 14 TIPO DE DROGAS REGISTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRODUCTO DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Tipo de Drogas	395	119	202	45	29
Alcohol	93.2%	93.3%	91.6%	100.0%	93.1%
Marihuana	5.8%	8.4%	5.9%	0.0%	3.4%
Cocaína	0.5%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
Tranquilizantes	0.5%	0.8%	0.5%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.5%	0.0%	0.5%	2.2%	0.0%
Metanfetaminas	3.3%	0.8%	5.4%	0.0%	3.4%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

INFORMACIÓN EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS

Cuadro No. 15 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Número	395	119	202	45	29

Cuadro No. 16 NÚMERO DE CASOS POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	395	119	202	45	29
5 a 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10 a 14	0.8%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%
15 a 19	6.6%	6.7%	8.4%	2.2%	0.0%
20 a 24	11.9%	10.9%	14.9%	4.4%	6.9%
25 a 29	15.4%	15.1%	16.3%	20.0%	3.4%
30 a 34	11.9%	6.7%	15.8%	8.9%	10.3%
35 a 39	12.2%	10.1%	12.4%	17.8%	10.3%
40 a 44	13.7%	13.4%	13.9%	17.8%	6.9%
45 a 49	7.6%	6.7%	6.4%	8.9%	17.2%
50 a 54	5.6%	5.9%	5.0%	6.7%	6.9%
55 a 59	4.3%	7.6%	2.5%	0.0%	10.3%
60 a 64	3.5%	6.7%	1.5%	4.4%	3.4%
65 a 69	3.0%	3.4%	1.5%	8.9%	3.4%
70 a >	3.5%	4.2%	1.5%	0.0%	20.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 17 GÉNERO DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Sexo	395	119	202	45	29
Masculino	87.6%	87.4%	91.1%	84.4%	69.0%
Femenino	12.4%	12.6%	8.9%	15.6%	31.0%

Cuadro No. 18 CADÁVERES DEL GÉNERO FEMENINO POSITIVOS A DROGAS SEGÚN EMBARAZO Y PRODUCTO DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	49	15	18	7	9
Si	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%
No	12.2%	12.6%	8.9%	15.6%	27.6%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 19 ESTADO DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL DE LA MUERTE					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	395	119	202	45	29
Baja California Norte	1		1		
Chihuahua	1				1
Guanajuato	1	1			
Guerrero	1	1			
Hidalgo	1	1			
Jalisco	382	110	200	45	27
Michoacán	2	2			
Oaxaca	1	1			
Sonora	1	1			
Veracruz	1	1			
Zacatecas	1		1		
Otro País	2	1			1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 20.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	395	119	202	45	29
Acatic	1	0	1	0	0
Acatlán de Juárez	2	0	2	0	0
Ahualulco del Mercado	0	0	0	0	0
Amacueca	0	0	0	0	0
Amatitán	0	0	0	0	0
Ameca	0	0	0	0	0
San Juanito de Escobedo	0	0	0	0	0
Arandas	0	0	0	0	0
Arenal	0	0	0	0	0
Atemajac de Brizuela	1	0	1	0	0
Atengo	0	0	0	0	0
Atenguillo	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	1	1	0	0	0
Atoyac	1	0	0	0	1
Autlán de Navarro	1	0	0	0	1
Ayotlán	0	0	0	0	0
Ayutla	0	0	0	0	0
Barca	0	0	0	0	0
Bolaños	0	0	0	0	0
Cabo Corrientes	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	0	0	0	0	0
Cihuatlán	0	0	0	0	0
Zapotlán El Grande	0	0	0	0	0
Cocula	0	0	0	0	0
Colotlán	0	0	0	0	0
Concepción de Buenos Aires	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 20.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	395	119	202	45	29
Cuautitlán de García Barragán	0	0	0	0	0
Cuautla	0	0	0	0	0
Cuquío	0	0	0	0	0
Chapala	9	9	0	0	0
Chimaltitlán	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	0	0	0	0	0
Degollado	0	0	0	0	0
Ejutla	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	0	0	0	0	0
Etzatlán	1	0	1	0	0
Grullo	0	0	0	0	0
Guachinango	0	0	0	0	0
Guadalajara	92	23	47	18	4
Hostotipaquillo	0	0	0	0	0
Huejúcar	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	0	0	0	0	0
Huerta	0	0	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	2	1	1	0	0
Ixtlahuacán del Río	1	1	0	0	0
Jalostotitlán	0	0	0	0	0
Jamay	0	0	0	0	0
Jesús María	0	0	0	0	0
Jilotlán de los Dolores	0	0	0	0	0
Jocotepec	4	3	1	0	0
Juanacatlán	0	0	0	0	0
Juchitlán	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 20.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	395	119	202	45	29
Lagos de Moreno	1	0	0	1	0
Limón	0	0	0	0	0
Magdalena	0	0	0	0	0
Santa María del Oro	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	0	0	0	0	0
Mascota	0	0	0	0	0
Mazamitla	4	4	0	0	0
Mexxicacán	0	0	0	0	0
Mezquitic	0	0	0	0	0
Mixtlán	0	0	0	0	0
Ocotlán	1	1	0	0	0
Ojuelos de Jalisco	0	0	0	0	0
Pihuamo	0	0	0	0	0
Poncitlán	1	1	0	0	0
Puerto Vallarta	0	0	0	0	0
Villa Purificación	0	0	0	0	0
Quitupan	0	0	0	0	0
Salto	20	4	13	1	2
San Cristóbal de la Barranca	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	0	0	0	0	0
San Julián	0	0	0	0	0
San Marcos	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	0	0	0	0	0
San Martín de Hidalgo	0	0	0	0	0
San Miguel el Alto	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 20.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	395	119	202	45	29
Gómez Farías	0	0	0	0	0
San Sebastián del Oeste	0	0	0	0	0
Santa María de los Ángeles	0	0	0	0	0
Sayula	0	0	0	0	0
Tala	2	0	1	1	0
Talpa de Allende	0	0	0	0	0
Tamazula de Gordiano	2	2	0	0	0
Tapalpa	0	0	0	0	0
Tecalitlán	0	0	0	0	0
Tecolotlán	0	0	0	0	0
Techaluta de Montenegro	0	0	0	0	0
Tenamaxtlán	0	0	0	0	0
Teocaltiche	1	0	1	0	0
Teocuitatlán de Corona	0	0	0	0	0
Tepatitlán de Morelos	3	0	2	0	1
Tequila	1	1	0	0	0
Teuchitlán	0	0	0	0	0
Tizapán el Alto	0	0	0	0	0
Tlajomulco de Zúñiga	52	16	26	5	5
Tlaquepaque	54	7	38	8	1
Tolimán	1	0	1	0	0
Tomatlán	0	0	0	0	0
Tonalá	32	9	22	1	0
Tonaya	0	0	0	0	0
Tonila	0	0	0	0	0
Totatiche	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 20.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER POSITIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	395	119	202	45	29
Tototlán	0	0	0	0	0
Tuxcacuesco	0	0	0	0	0
Tuxcueca	1	1	0	0	0
Tuxpan	0	0	0	0	0
Unión de San Antonio	0	0	0	0	0
Unión de Tula	0	0	0	0	0
Valle de Guadalupe	0	0	0	0	0
Valle de Juárez	0	0	0	0	0
San Gabriel	0	0	0	0	0
Villa Corona	2	1	0	0	1
Villa Guerrero	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	0	0	0	0	0
Cañadas de Obregón	0	0	0	0	0
Yahualica de González Gallo	0	0	0	0	0
Zacoalco de Torres	0	0	0	0	0
Zapopan	78	18	40	10	10
Zapotiltic	0	0	0	0	0
Zapotitlán de Vadillo	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	1	1	0	0	0
Zapotlanejo	9	6	2	0	1
San Ignacio Cerro Gordo	0	0	0	0	0
Desconocido o de Otros Estados	13	9	2	0	2

CONDICIONES DEL FALLECIMIENTO EL CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS

Cuadro No. 21.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 395	Accidente 119	Homicidio 202	Suicidio 45	No Violenta 29
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	80	25	55	0	0
T71	Asfixia	79	12	33	34	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	60	40	20	0	0
S01	Herida de la cabeza	51	2	46	3	0
S21	Herida del tórax	30	4	26	0	0
I21	Infarto agudo del miocardio	13	1	0	0	12
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	10	0	10	0	0
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	9	9	0	0	0
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	6	2	0	4	0
J18	Edema pulmonar	5	1	0	0	4
I60	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	4	3	1	0	0
J81	Edema pulmonar	4	3	0	0	1
X93	Agresión con disparo de arma corta	4	0	4	0	0
K25	Úlcera gástrica	3	0	0	0	3
S11	Herida del cuello	3	0	2	1	0
T06	Asfixia	3	3	0	0	0
T51	Efecto tóxico del alcohol	3	3	0	0	0
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	2	0	0	0	2
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	2	0	0	0	2
S20	Traumatismo superficial del tórax	2	1	1	0	0
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	2	2	0	0	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	2	2	0	0	0
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	2	2	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 21.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS
SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

		Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	395	119	202	45	29
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	0	0	2	0
A41	Otras Sepsis	1	0	0	0	1
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	0	0	0	1
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	1	0	0	0	1
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	1	0	0	0	1
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	1	0	0	0	1
S06	Traumatismo intracraneal	1	0	1	0	0
S08	Amputación traumática de parte de la cabeza	1	0	1	0	0
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	1	0	1	0	0
S29	Otros traumatismos y los no especificados del tórax	1	0	1	0	0
S71	Herida de la cadera y del muslo	1	1	0	0	0
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	1	1	0	0	0
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	1	1	0	0	0
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	1	1	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	1	0	0	1	0

**Cuadro No. 22.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

		Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
	Causa Básica de la Muerte	395	119	202	45	29
X93	Agresión con disparo de arma corta	120	0	120	0	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	37	37	0	0	0
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	31	0	31	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	30	0	0	30	0
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	29	0	29	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	22	22	0	0	0
X99	Agresión con objeto cortante	15	0	15	0	0
I21	Infarto agudo del miocardio	11	0	0	0	11
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	10	10	0	0	0
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	8	8	0	0	0
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	7	7	0	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	5	1	0	0	4
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	5	5	0	0	0
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	5	0	0	5	0
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	4	1	0	3	0
K25	Úlcera gástrica	3	0	0	0	3
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	3	0	3	0	0
T51	Efecto tóxico del alcohol	3	3	0	0	0
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	3	3	0	0	0
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	2	0	0	0	2
J81	Edema pulmonar	2	1	0	0	1

**Cuadro No. 22.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN**

		Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
	Causa Básica de la Muerte	395	119	202	45	29
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	2	0	0	0	2
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	2	0	0	0
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	2	0	2	0	0
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	2	2	0	0	0
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	2	2	0	0	0
W78	Inhalación de contenidos gástricos	2	2	0	0	0
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	2	2	0	0	0
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	2	0	0	2	0
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	0	1	1	0
A41	Otras Sepsis	1	0	0	0	1
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1	0	0	0	1
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	1	0	0	0	1
I26	Embolia pulmonar	1	0	0	0	1
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	1	0	0	0	1
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	1	0	0	0	1
S01	Herida de la cabeza	1	0	1	0	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	1	1	0	0	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	1	1	0	0	0
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	1	1	0	0	0
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	1	1	0	0	0
T71	Asfixia	1	1	0	0	0
V21	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	0	0	0
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	1	1	0	0	0
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	1	1	0	0	0
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	1	1	0	0	0
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	1	1	0	0	0
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	1	1	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 22.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN						
		Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
	Causa Básica de la Muerte	395	119	202	45	29
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	1	0	0	1	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	1	0	0	1	0
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	0	0	1	0
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	1	0	0	1	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 23 LUGAR EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre la muerte	395	119	202	45	29
En tránsito	18.0%	59.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Hogar	18.5%	12.6%	8.9%	66.7%	34.5%
Vía Pública	45.3%	5.0%	79.7%	8.9%	27.6%
Escuela	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sitio de recreación	0.5%	0.8%	0.5%	0.0%	0.0%
Trabajo	1.3%	3.4%	0.0%	0.0%	3.4%
Otro	16.5%	18.5%	10.9%	24.4%	34.5%
Se desconoce	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 24 MES EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE EN POSITIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	395	119	202	45	29
Enero	8.9%	5.9%	10.9%	4.4%	13.8%
Febrero	9.4%	7.6%	9.4%	11.1%	13.8%
Marzo	8.1%	8.4%	7.9%	6.7%	10.3%
Abril	5.6%	6.7%	4.5%	11.1%	0.0%
Mayo	12.2%	16.0%	11.9%	6.7%	6.9%
Junio	10.1%	12.6%	8.9%	8.9%	10.3%
Julio	7.8%	10.1%	5.4%	13.3%	6.9%
Agosto	14.2%	15.1%	13.9%	15.6%	10.3%
Septiembre	6.1%	5.0%	6.4%	4.4%	10.3%
Octubre	4.1%	2.5%	5.9%	2.2%	0.0%
Noviembre	3.0%	0.8%	4.5%	2.2%	3.4%
Diciembre	10.6%	9.2%	10.4%	13.3%	13.8%

DATOS DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA

Cuadro No. 25 TIPO DE DROGAS ENCONTRADAS EN CADÁVERES SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Tipo de Drogas	395	119	202	45	29
Alcohol	93.2%	93.3%	91.6%	100.0%	93.1%
Marihuana	5.8%	8.4%	5.9%	0.0%	3.4%
Cocaína	0.5%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
Tranquilizantes	0.5%	0.8%	0.5%	0.0%	0.0%
Anfetaminas	0.5%	0.0%	0.5%	2.2%	0.0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

INFORMACIÓN DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro No. 26 NÚMERO DE CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Número	3,011	822	1,492	360	337

Cuadro No. 27 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS CON INFORMACIÓN COMPLETA PARA SISVEA SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Anónimo	3011	822	1492	360	337
Si	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 28 GÉNERO DE LOS CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Sexo	3,011	822	1,492	360	337
Masculino	84.1%	79.4%	88.7%	80.3%	79.2%
Femenino	15.9%	20.6%	11.3%	19.7%	20.8%

Cuadro No. 29 CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS DEL SEXO FEMENINO SEGÚN ESTADO GRÁVIDO POR PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Embarazo	479	169	169	71	70
Si	0.8%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%
No	99.2%	100.0%	97.6%	100.0%	100.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 30 EDAD DEL CADÁVER NEGATIVOS A DROGAS Y PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Edad del cadáver	3,011	822	1,492	360	337
5 a 9	0.6%	1.6%	0.1%	0.0%	0.9%
10 a 14	0.9%	1.6%	0.5%	1.4%	0.3%
15 a 19	6.4%	9.6%	5.5%	7.2%	1.8%
20 a 24	12.8%	10.6%	15.6%	14.7%	3.9%
25 a 29	14.4%	9.4%	19.1%	17.2%	3.0%
30 a 34	12.3%	9.5%	14.9%	15.6%	4.2%
35 a 39	11.2%	7.9%	13.5%	11.1%	8.6%
40 a 44	8.5%	6.6%	9.7%	8.3%	8.0%
45 a 49	7.5%	6.9%	7.4%	8.3%	8.3%
50 a 54	6.0%	6.3%	5.3%	6.1%	8.3%
55 a 59	5.1%	6.4%	3.4%	2.2%	13.1%
60 a 64	3.7%	5.4%	1.7%	3.6%	8.6%
65 a 69	2.7%	3.4%	1.1%	3.1%	7.4%
70 a >	7.9%	14.8%	2.2%	1.1%	23.7%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 31.1 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Aguascalientes	7	1	6	0	0
Baja California Norte	3	3	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0
Colima	6	2	1	0	3
Chiapas	5	5	0	0	0
Chihuahua	1	0	0	0	1
Distrito Federal	4	2	1	0	1
Durango	3	1	0	0	2
Guanajuato	8	2	4	0	2
Guerrero	1	0	1	0	0
Hidalgo	1	1	0	0	0
Jalisco	2895	774	1446	357	318
México	17	7	8	0	2
Michoacán	18	7	11	0	0
Morelos	0	0	0	0	0
Nayarit	9	6	2	0	1
Nuevo León	1	1	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0
Puebla	2	0	1	1	0
Querétaro	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	3	1	1	0	1
Sinaloa	3	1	2	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 31.2 ESTADO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Estado de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Sonora	3	3	0	0	0
Tabasco	1	0	1	0	0
Tamaulipas	0	0	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0
Veracruz	3	1	2	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0
Zacatecas	8	2	4	0	2
Otro País	9	2	1	2	4

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32.1 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Acatic	4	2	2	0	0
Acatlán de Juárez	10	3	6	0	1
Ahualulco del Mercado	3	2	1	0	0
Amacueca	1	1	0	0	0
Amatitán	1	1	0	0	0
Ameca	2	1	1	0	0
San Juanito de Escobedo	0	0	0	0	0
Arandas	6	4	2	0	0
Arenal	5	1	0	2	2
Atemajac de Brizuela	2	2	0	0	0
Atengo	0	0	0	0	0
Atenguillo	0	0	0	0	0
Atotonilco el Alto	8	4	2	0	2
Atoyac	0	0	0	0	0
Autlán de Navarro	4	3	0	0	1
Ayotlán	1	1	0	0	0
Ayutla	1	1	0	0	0
Barca	3	2	1	0	0
Bolaños	2	2	0	0	0
Cabo Corrientes	0	0	0	0	0
Casimiro Castillo	0	0	0	0	0
Cihuatlán	2	1	1	0	0
Zapotlán El Grande	3	3	0	0	0
Cocula	3	1	2	0	0
Colotlán	1	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32.2 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Concepción de Buenos Aires	0	0	0	0	0
Cuautitlán de García Barragán	0	0	0	0	0
Cuautla	0	0	0	0	0
Cuquío	3	2	0	0	1
Chapala	43	16	20	1	6
Chimaltitlán	0	0	0	0	0
Chiquilistlán	1	0	1	0	0
Degollado	1	0	1	0	0
Ejutla	0	0	0	0	0
Encarnación de Díaz	1	1	0	0	0
Etzatlán	0	0	0	0	0
Grullo	0	0	0	0	0
Guachinango	0	0	0	0	0
Guadalajara	723	147	395	85	96
Hostotipaquillo	0	0	0	0	0
Huejúcar	0	0	0	0	0
Huejuquilla el Alto	0	0	0	0	0
Huerta	2	2	0	0	0
Ixtlahuacán de los Membrillos	34	9	20	2	3
Ixtlahuacán del Río	18	9	3	2	4
Jalostotitlán	2	1	1	0	0
Jamay	2	2	0	0	0
Jesús María	0	0	0	0	0
Jilotlán de los Dolores	0	0	0	0	0
Jocotepec	38	12	15	8	3
Juanacatlán	21	7	11	2	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32.3 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Juchitlán	0	0	0	0	0
Lagos de Moreno	4	2	1	0	1
Limón	1	1	0	0	0
Magdalena	0	0	0	0	0
Santa María del Oro	0	0	0	0	0
Manzanilla de la Paz	0	0	0	0	0
Mascota	0	0	0	0	0
Mazamitla	2	2	0	0	0
Mexxicacán	0	0	0	0	0
Mezquitic	2	0	1	1	0
Mixtlán	0	0	0	0	0
Ocotlán	11	7	1	3	0
Ojuelos de Jalisco	1	1	0	0	0
Pihuamo	0	0	0	0	0
Poncitlán	2	0	2	0	0
Puerto Vallarta	8	6	1	0	1
Villa Purificación	0	0	0	0	0
Quitupan	0	0	0	0	0
Salto	183	46	102	18	17
San Cristóbal de la Barranca	0	0	0	0	0
San Diego de Alejandría	0	0	0	0	0
San Juan de los Lagos	0	0	0	0	0
San Julián	0	0	0	0	0
San Marcos	0	0	0	0	0
San Martín de Bolaños	0	0	0	0	0
San Martín de Hidalgo	1	1	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
San Miguel el Alto	2	1	0	1	0
Gómez Farías	0	0	0	0	0
San Sebastián del Oeste	1	0	0	1	0
Santa María de los Ángeles	0	0	0	0	0
Sayula	4	3	1	0	0
Tala	9	6	3	0	0
Talpa de Allende	1	0	1	0	0
Tamazula de Gordiano	8	6	1	1	0
Tapalpa	1	0	0	0	1
Tecalitlán	3	1	0	1	1
Tecolotlán	1	1	0	0	0
Techaluta de Montenegro	0	0	0	0	0
Tenamaxtlán	0	0	0	0	0
Teocaltiche	0	0	0	0	0
Teocuitatlán de Corona	2	0	2	0	0
Tepatitlán de Morelos	9	7	2	0	0
Tequila	9	6	1	1	1
Teuchitlán	0	0	0	0	0
Tizapán el Alto	0	0	0	0	0
Tlajomulco de Zúñiga	374	80	208	47	39
Tlaquepaque	465	89	273	57	46
Tolimán	0	0	0	0	0
Tomatlán	0	0	0	0	0
Tonalá	267	62	152	33	20
Tonaya	0	0	0	0	0
Tonila	0	0	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 32.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA DEL CADÁVER NEGATIVO A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE LA DEFUNCIÓN					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Municipio de Residencia	3,011	822	1,492	360	337
Totatiche	1	0	1	0	0
Tototlán	2	1	1	0	0
Tuxcacuesco	1	0	1	0	0
Tuxcueca	3	1	1	1	0
Tuxpan	0	0	0	0	0
Unión de San Antonio	0	0	0	0	0
Unión de Tula	1	1	0	0	0
Valle de Guadalupe	1	1	0	0	0
Valle de Juárez	0	0	0	0	0
San Gabriel	0	0	0	0	0
Villa Corona	9	4	2	2	1
Villa Guerrero	0	0	0	0	0
Villa Hidalgo	1	1	0	0	0
Cañadas de Obregón	0	0	0	0	0
Yahualica de González Gallo	1	1	0	0	0
Zacoalco de Torres	3	1	2	0	0
Zapopan	517	171	199	83	64
Zapotiltic	1	1	0	0	0
Zapotitlán de Vadillo	0	0	0	0	0
Zapotlán del Rey	2	1	0	1	0
Zapotlanejo	28	18	2	4	4
San Ignacio Cerro Gordo	0	0	0	0	0
Otros Estados o País	118	49	46	3	20

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 33.1 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
T71	Asfixia	622	87	245	289	1
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	489	140	346	3	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	420	285	132	2	1
S01	Herida de la cabeza	401	12	377	12	0
S21	Herida del tórax	203	28	175	0	0
I21	Infarto agudo del miocardio	121	3	0	0	118
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	95	19	76	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	66	3	1	0	62
S11	Herida del cuello	51	1	49	1	0
I60	Hemorragia subaracnoidea	43	26	11	0	6
J81	Edema pulmonar	42	8	1	7	26
S20	Traumatismo superficial del tórax	42	36	6	0	0
S06	Traumatismo intracraneal	38	25	13	0	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	33	26	7	0	0
T06	Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	27	24	3	0	0
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	24	3	0	21	0
K25	Úlcera gástrica	23	0	0	0	23
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	19	5	0	0	14
A41	Otras Sepsis	13	2	2	0	9
I61	Hemorragia intraencefálica	13	6	2	0	5
S30	Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	13	7	6	0	0
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	13	9	4	0	0
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	13	0	0	13	0

**Cuadro No. 33.2 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	12	0	0	0	12
I26	Embolia pulmonar	9	0	1	0	8
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	8	0	0	0	8
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	8	0	8	0	0
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	7	7	0	0	0
G93	Otros trastornos del encéfalo	6	3	0	0	3
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	6	0	0	0	6
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	6	3	3	0	0
X93	Agresión con disparo de arma corta	6	0	6	0	0
S08	Amputación traumática de parte de la cabeza	5	2	2	1	0
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	5	0	5	0	0
K65	Peritonitis	4	0	0	0	4
R57	Choque, no clasificado en otra parte	4	1	0	2	1
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	4	4	0	0	0
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	4	4	0	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	4	0	0	4	0
I50	Insuficiencia cardíaca	3	0	0	0	3
K57	Enfermedad diverticular del intestino	3	0	0	0	3
K85	Pancreatitis aguda	3	0	0	0	3
S12	Fractura del cuello	3	3	0	0	0
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	3	3	0	0	0
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3	3	0	0	0
X99	Agresión con objeto cortante	3	0	3	0	0
A87	Meningitis viral	2	1	0	0	1
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2	0	0	0	2
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	2	1	0	0	1
I71	Aneurisma y disección aórticos	2	1	0	0	1

**Cuadro No. 33.3 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	2	0	1	0	1
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	2	2	0	0	0
S15	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello	2	1	1	0	0
S71	Herida de la cadera y del muslo	2	0	2	0	0
S75	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo	2	2	0	0	0
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	2	2	0	0	0
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	2	2	0	0	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	2	2	0	0	0
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2	2	0	0	0
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	2	2	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	2	0	0	2	0
C71	Tumor maligno del encéfalo	1	0	0	0	1
D07	Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados	1	0	0	0	1
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	0	0	0	1
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	1	0	0	0	1
I31	Otras enfermedades del pericardio	1	1	0	0	0
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	1	0	0	0	1
I46	Paro cardíaco	1	0	0	0	1
I63	Infarto cerebral	1	0	0	0	1
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	1	0	0	0	1
I74	Embolia y trombosis arteriales	1	0	0	0	1
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	1	0	0	1	0
K22	Otras enfermedades del esófago	1	0	0	0	1
K35	Apendicitis aguda	1	0	0	0	1
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	1	0	0	0	1

**Cuadro No. 33.4 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Directa de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1	0	0	0	1
N18	Enfermedad renal crónica	1	0	0	0	1
R65	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica	1	0	0	0	1
S02	Fractura de huesos del cráneo y de la cara	1	0	1	0	0
S07	Traumatismo por aplastamiento de la cabeza	1	1	0	0	0
S13	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello	1	1	0	0	0
S32	Fractura de la columna lumbar y de la pelvis	1	1	0	0	0
S36	Traumatismo de órganos intraabdominales	1	1	0	0	0
S81	Herida de la pierna	1	0	1	0	0
T00	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	1	1	0	0	0
T07	Traumatismos múltiples, no especificados	1	1	0	0	0
T54	Efecto tóxico de sustancias corrosivas	1	0	0	1	0
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	1	1	0	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	1	0	0	0
V72	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1	1	0	0	0
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	1	1	0	0	0
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	1	1	0	0	0
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	1	0	0	0
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	1	1	0	0	0
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	1	0	0	1	0
X86	Agresión con sustancia corrosiva	1	0	1	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 33.5 CAUSA DIRECTA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO						
		Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
CIE-10	Causa Directa de la Muerte	3,011	822	1,492	360	337
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	1	0	1	0	0
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	1	1	0	0	0

**Cuadro No. 34.1 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
X93	Agresión con disparo de arma corta	891	0	891	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	279	0	0	279	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	239	236	0	0	3
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	230	0	230	0	0
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	216	5	211	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	157	157	0	0	0
X99	Agresión con objeto cortante	124	0	123	1	0
I21	Infarto agudo del miocardio	115	0	0	0	115
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	108	108	0	0	0
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	67	67	0	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	65	1	0	2	62
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	47	47	0	0	0
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	33	0	0	33	0
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	24	24	0	0	0
J81	Edema pulmonar	22	1	0	0	21
K25	Úlcera gástrica	19	0	0	0	19
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	17	4	1	0	12
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	17	3	0	14	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	17	15	2	0	0
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	13	13	0	0	0
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	12	0	0	0	12

**Cuadro No. 34.2 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	12	12	0	0	0
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	11	0	0	0	11
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	10	7	2	0	1
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	10	8	0	2	0
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	10	9	0	0	1
W10	Caída en o desde escalera o escalones	10	10	0	0	0
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	10	0	10	0	0
A41	Otras Sepsis	9	0	0	0	9
I26	Embolia pulmonar	9	0	0	0	9
T71	Asfixia	9	1	5	3	0
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	9	0	0	9	0
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	8	0	0	0	8
I60	Hemorragia subaracnoidea	7	1	0	0	6
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	7	7	0	0	0
W18	Otras caídas en el mismo nivel	6	6	0	0	0
W19	Caída no especificada	6	6	0	0	0
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	6	6	0	0	0
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	6	6	0	0	0
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	6	6	0	0	0
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	6	6	0	0	0
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	5	2	3	0	0
W78	Inhalación de contenidos gástricos	5	4	0	0	1
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	1	0	4	0
I61	Hemorragia intraencefálica	4	0	0	0	4

**Cuadro No. 34.3 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
K57	Enfermedad diverticular del intestino	4	0	0	0	4
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	4	4	0	0	0
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	4	0	0	4	0
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	4	0	0	4	0
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	4	0	4	0	0
G93	Otros trastornos del encéfalo	3	2	0	0	1
I50	Insuficiencia cardíaca	3	0	0	0	3
K65	Peritonitis	3	0	0	0	3
K85	Pancreatitis aguda	3	0	0	0	3
N18	Enfermedad renal crónica	3	1	0	0	2
S01	Herida de la cabeza	3	0	3	0	0
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	3	3	0	0	0
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	3	3	0	0	0
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	3	3	0	0	0
A87	Meningitis viral	2	1	0	0	1
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	2	0	0	0	2
I71	Aneurisma y disección aórticos	2	0	0	0	2
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	2	0	0	0	2
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	2	2	0	0	0
W39	Explosión de fuegos artificiales	2	2	0	0	0
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	2	2	0	0	0
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	2	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	2	0	0	2	0
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	0	0	2	0
Y09	Agresión por medios no especificados	2	0	2	0	0
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1	0	0	0	1
C71	Tumor maligno del encéfalo	1	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
 RESULTADOS 2020

**Cuadro No. 34.4 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS
 SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO**

CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	0	0	0	1
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	1	0	0	0	1
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	1	0	0	0	1
I10	Hipertensión esencial (primaria)	1	0	0	0	1
I31	Otras enfermedades del pericardio	1	1	0	0	0
I46	Paro cardíaco	1	0	0	0	1
I63	Infarto cerebral	1	0	0	0	1
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	1	0	0	0	1
I72	Otros aneurismas y aneurismas disecantes	1	0	0	0	1
I74	Embolia y trombosis arteriales	1	0	0	0	1
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	1	0	0	1	0
K22	Otras enfermedades del esófago	1	0	0	0	1
K35	Apendicitis aguda	1	0	0	0	1
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	1	0	0	0	1
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0	0	0	1
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	1	0	0	0	1
R16	Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte	1	0	0	0	1
R57	Choque, no clasificado en otra parte	1	0	0	0	1
R65	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica	1	0	0	0	1
S06	Traumatismo intracraneal	1	0	1	0	0
S14	Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello	1	1	0	0	0
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	1	0	1	0	0
T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello	1	1	0	0	0
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1	1	0	0	0
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0
V23	Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	0
V34	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	1	0	0	0	1

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 34.5 CAUSA BÁSICA DE LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DE FALLECIMIENTO						
CIE-10	Causa Básica de la Muerte	Global 3,011	Accidente 822	Homicidio 1,492	Suicidio 360	No Violenta 337
V72	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1	1	0	0	0
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1	1	0	0	0
W03	Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona	1	1	0	0	0
W29	Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor	1	1	0	0	0
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	1	1	0	0	0
W35	Explosión y rotura de caldera	1	1	0	0	0
W54	Mordedura o ataque de perro	1	1	0	0	0
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	1	0	0	0
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	1	1	0	0	0
X79	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	1	1	0	0	0
X90	Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas	1	0	1	0	0
Y01	Agresión por empujón desde un lugar elevado	1	0	1	0	0
Y04	Agresión con fuerza corporal	1	0	1	0	0
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	1	1	0	0	0
Y26	Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada	1	1	0	0	0

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 35 LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGAS SEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Lugar en que ocurre la muerte	3,011	822	1,492	360	337
En tránsito	14.8%	53.6%	0.1%	0.6%	0.0%
Hogar	21.3%	11.4%	9.9%	78.3%	34.7%
Vía Pública	42.5%	6.6%	76.5%	3.9%	21.1%
Escuela	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.3%
Sitio de recreación	0.3%	0.6%	0.1%	0.0%	0.3%
Trabajo	1.0%	3.3%	0.1%	0.0%	0.6%
Otro	20.0%	24.5%	13.1%	16.9%	43.0%
Se desconoce	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

Cuadro No. 36 MES DONDE OCURRIÓ LA MUERTE EN CADÁVERES NEGATIVOS A DROGASSEGÚN PRODUCTO DEL FALLECIMIENTO					
	Global	Accidente	Homicidio	Suicidio	No Violenta
Mes del año	3,011	822	1,492	360	337
Enero	7.1%	7.8%	6.5%	6.9%	8.6%
Febrero	7.2%	9.2%	6.3%	8.3%	5.3%
Marzo	8.9%	6.3%	10.5%	8.9%	8.6%
Abril	9.2%	7.2%	10.7%	7.8%	8.9%
Mayo	8.7%	7.5%	9.2%	10.8%	6.5%
Junio	8.4%	8.8%	8.0%	7.5%	10.7%
Julio	8.7%	8.6%	8.9%	7.5%	9.2%
Agosto	7.4%	8.0%	7.0%	8.3%	6.8%
Septiembre	8.3%	8.5%	7.6%	11.1%	8.3%
Octubre	9.3%	9.6%	9.9%	7.2%	8.0%
Noviembre	8.6%	9.4%	8.0%	8.6%	9.2%
Diciembre	8.1%	9.0%	7.4%	6.9%	9.8%

CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS ADICTIVAS

Alcohol:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Alcohol Etilico o Etanol.

Especies:

Destilados y fermentados: Vino, Tequila, Brandy, Whisky, Vodka, Cerveza, Cooler, Ron, Alcohol puro, Pulque, Charanda, Sotol,

Nombres Comunes:

Alipuses, caballos, caballito, chabelas, chelas, cheves, chupes, chupirules, cubas, copas, cuete, guachicoles, heladas, helodias, jaibol, michelada, michela, pajaretes, pedo, pegue, pisto, salpicón, tequilas, tecailas, wino, yarda.

Marihuana:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central (Alucinógeno).

Compuesto Activo:

Delta 9 Tetrahidrocannabinol (9THC)

Especies:

Cannabis Sativa, Cannabis Erratic, Cannabis Índica, Cannabis Rudelaris.

Nombres Populares:

Cannabis. Caña, chora, churro, grass (yerba), federal, hachich, hash, hashís, hoja verde, joint (enganche), juana, juanita, marijuana, Mery Jane, mota, mostaza naconha, pasto, pot, pura federal, quemando las patas a judas, reefer (rizador), tabaco federal, toque, vaisa, yesca, yerba, yerba buena, weed, (maleza), sikeak, jerry, tonco, tronco, efervesciente, clorotina, black dan, gardor, café, hiloraina, zickzack, silexico.

Otros: Spice

Inhalantes y Solventes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Adhesivos:

Compuestos Activos:

Acetato de Etileno, Acetona, Epoxi, Hexano, Estireno-Butadieno, Gasolina, Poliestireno, Tetracloroetileno, Tolueno, Toluol, Tricloroetileno.

Producto:

Pegamentos: Tolueno, acetato de etilo y acetonas.

Cementos especiales: Tricloroetileno y tetracloroetileno.

Pegamentos de uso general: Mucilago de dextrina, Cola de nitrocelulosa, cola de acetato de polivinilo, mucilago de goma arábica.

Cola Plástica: Acetato de Polivinilo, epoxi, cola de nitrocelulosa y poliestireno.

Cola para papel: Cola de dextrina y goma de almidón.

Adhesivo de contacto: Látex de neopreno y hexano.

Cola para porcelana: Acetato de polivinilo y nitrato de celulosa.

Cola para zapatos: Hexano, gasolina y nitrato de celulosa.

Cola para cuero: Resina, tolueno, Hexano, cola de nitrocelulosa, cola de poliestireno y acetato de polivinilo.

Cola para modelos: Acetona, acetatos, tulol, alcanfor.

Cola para papel de pared: Resina, estireno-butadieno.

Nombres Comunes.

Chemo (bolsa), globo, inflado, soplado

Aerosoles:

Compuestos Activos:

Butano, Dimetil-Éter, Fluorocarbonos, Hidrocarburos, Hidrofluorocarbonados, Propano, Tricloroetano.

Productos:

Sprays de Pintura: Butano, propano, fluorocarburos, tolueno e hidrocarburos.

Sprays de cabello: Butano, propano, clorofluorocarbonos.

Sprays analgésicos: Clorofluorocarbonados.

Sprays para el asma: Clorofluorocarbonados.

Sprays para telas: Butano y tricloroetano.

Limpiadores de computadoras: Dimetil éter e hidrofluorocarbonados.

Nombres Comunes:

Aerosol, Aire, Comprimidos, Spray, Saint.

Anestésicos:

Compuestos Activos: Cloroformo, Cloruro de Etilo, Enflurano, Éter, Halotano, Óxido Nitroso.

Solventes y Gases.

Compuestos Activos:

Acetona, Acetato de Etilo, Acetato de Metilo, Bromoclorodifluoroetano, Butano, Cloruro de Metilo, Destilados del Tricloroetano, Isopropano, Tolueno.

Producto:

Removedor de barniz de uñas: Acetona y acetato de etilo.

Removedor de pinturas: Tolueno, cloruro de metilo, acetona, acetato demetilo.

Líquido Corrector: tricloroetileno y tricloroetano.

Gas líquido de encendedor: Butano e isopropano.

Extinguidor de fuego: Bromoclorodifluorometano.

Aguarrás

Activo: tonzol.

Agua de Celeste.

Gasolina y diesel.

Limpiadores:

Compuestos Activos:

Clorohidrocarburos, Destilados del Petróleo, Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Tricloroetano, Xileno.

Productos:

Desmanchadores: Xileno, destilados del petróleo y clorohidrocarburos.

Lavado en seco: tetracloroetileno y tricloroetileno.

Petróleo.

Nombres Comunes:

Activo, celeste, chemo, estopa, mona, toncho, vaina, vainilla,

Alucinógenos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Antihistamínicos:

Compuestos Activos:

Astemizol, Bromfeniramina, Clemastina, Clorferinamina, Cromoglicato, Feniramina, Loratadina, Pirlamina, Terfenadina.

Otros:

Dietilamida del ácido lisérgico, Dietiltriptamina, Dimetiltriptamina, Dimetoxianfetamina, Fenciclidina, Feniletilamina (mezcalina), Psilocibina, Psilocina, Bufotenina.

Nombres Comunes:

Ácidos, mezcal, hongos, zetas.

Heroína:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

3-6 Diacetylmorfina.

Nombres comunes.

Chiva, Arpón, Arponazo

Opio o Morfina y Derivados:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Morfina y Opio.

Derivados de la Morfina:

Compuestos Activos:

Alfentanil, Buprenorfina, Butorfanol, Codeína, Dextropropoxifeno, Fentanil, Hidromorfina, Meperidina, Metadona, Nalbufina, Oximorfina, Pentazocina, Propoxifen, Tramadol y Difenoxilato.

Principio Activo.

Desomorfina

Nombres comunes:

Krokodil, Cocodrilo, heroína de los pobres, heroína de los zombis.

Tranquilizantes:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Benzodiazepinas:

Compuestos Activos:

Acción Prolongada:

Clordiazepoxido, Diazepam, Flunitrazepam, Clonazepam, Praxepam, Clorazepato, Praxepam y Halazepam.

Acción Intermedia:

Oxazepam, Lorazepam, Temesepam, Alprazolam.

Acción Corta:

Midazolam, Triazolam.

Barbitúricos:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Amobarbital, Apobarbital, Fenobarbital, Secobarbital, Talbutal, Tiopental.

Otros Compuestos Activos:

Hidrato de Cloral, Etclorvinol, Etinamato, Etomidato, Glutemida, Meprobamato, Metiprilon, Paraldehido.

Gamahidroxitirato.

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo.

Gamahidroxitirato.

Nombre Común.

Éxtasis líquido, súper g, punto g, viola fácil,

Anfetaminas:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Metilfenidato, Bazedrina.

Sustancias Anoréxicas:

Compuestos Activos:

Anfepramona, Atropina, Benzetamina, Bromelina, Clobenzorex, Dextrofenfluramina, Dietilpropion, Fendimetrazina, Fenfluramina, Femproporex, Fentermina, Mazindol, Metilfenidato, norpseudoefedrina, Propilhexedrina.

Nombres Comunes:

Anfetas, anitas, fetas,

Anticolinérgicos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Aloína, Atropina, Belladona, Boldo, Datura, Difenoxilato y Mandrágora.

Antiespasmódicos:

Compuestos Activos:

Bromuro, Butilhioscina, Clidinio, Diccloverina, Etomidolina, Floroglucinol y Fenoverine, Hioscina, Metamizol, Pargeverina, Pinaverio, Pipenzolato, Prifinio, Ropifenazona, Trimebutina.

Antiparkinsonianos:

Compuestos Activos:

Biperideno, Bromocriptina, Carbidopa, Dopamina, Levodopa, Pergolida y Trihexifenidilo.

Cocaína:

Efecto.

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuestos Activos:

Clorhidrato de Cocaína, Sulfato de Cocaína.

Nombres Comunes.

Blanca nieves, Coca, Grapa, La Reyna, Nieve, Micha, Michela, Pase, Perico, Raya, Papel, Plástico.

Otros: Aticus, famous stars and straps, filinoica, chacha(r), AVC, antomina, pauder power, bang

Tabaco:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Nicotina.

Antidepresivos:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Antidepresivos tricíclicos y otras sustancias:

Compuesto Activo:

Ademetionina, Amitriptilina, Amoxapina, Citalopram, Clomipramina, Esipramina, Fluoxetina, Fluvoxamina, Hipericum, Imipramina, Litio, Maprotilina, Meclobemida, Mianserina, Nefazodona, Nortriptilina, Paroxetina, Sertralina, Sulpiride, Taneptina, Enlafaxina.

Iminoestilbenos:

Compuesto Activo:

Carbamacepina.

Fenitoínas:

Compuesto Activo:

Fenitoina.

Valproico:

Compuesto Activo:

Valproico Ácido.

Pasta Base: (Basuco)

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Basuco, Baserola, Base Libre, Bazoka, Free Base, Pasta.

Metanfetaminas (Cristales):

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Metilendioximetanfetamina (MDMA)

Nombres Comunes:

Cristal, Ectacy, Éxtasis, Ex, Metas, Meth, Tachas,

Otras presentaciones. Angelitos, Carita Feliz, Bart, Batman, Corona, Coronilla, Estrellas, Estrellitas, Simson, Versache, Maseratis, sirulax, asteroides, torofina, anaxle, felica, xt, general X, globos blancos, Blogo, omega, grino, ruedas, teamina, Cristalín, Bordín, UnderWhigle, purific, Bang, Catalenon, Dragones etc.

Flunitracepam:

Efecto:

Depresor del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Flunitracepam.

Nombres Comunes:

Rho, Reyna, Rohypnol, Roofies, Roche II.

Crack:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo:

Benzoilmetilecgonina.

Nombres Comunes:

Crack, Coca, Roca, Piedra.

Refractyl Ofteno:

Efecto:

Estimulante del Sistema Nervioso Central.

Compuesto Activo: Ciclopentolato

Antimuscarínico.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abstemio:

(Del lat. abstemius; de abs priv. y del lat. tenum, vino) adj. Que se abstiene del vino y en general de todo licor alcohólico. Enófobo.

Abstinencia:

(Del lat. abstinentia), f. A., Abstinenz; F. e In., Abstinente. It., abstieneza. Privación voluntaria de la satisfacción de apetitos. (Fenómenos o síntomas de). Fenómenos producidos por la cesación más o menos brusca de una sustancia de uso habitual como el alcohol, la morfina, etc.

Abuso:

Hábito desadaptativo diferente al que se produce en el caso de dependencia, se caracteriza por el uso continuo de un fármaco a pesar de que el sujeto está consciente de tener un problema causado o desencadenado por su consumo y pone en peligro su integridad psicofísica.

Abuso:

(Del lat. abusus) m. Uso exagerado de una sustancia o de un medicamento, que puede convertirse en causa nociva, como abuso de alcohol, tabaco, de los vinos espirituosos, etc.

Abuso de una Droga:

Es el consumo de una droga en forma excesiva, persistente o esporádica, incompatible o sin relación con la terapéutica médica habitual.

Acusma:

(Del gr. Akousma). F. Alucinación acústica; ruidos subjetivos. Acúfeno, fonema.

Adaptación:

(Del lat. ad. A y aptare, acomodar) F. A., Anpassung; F. e In., adaptation; It., Adattamento; P., adaptacao). Ajustamiento de un organismo al ambiente. Disminución de la frecuencia de impulsos de la actividad refleja cuando se repiten varias veces a estímulos sensoriales.

Adolescencia:

(Del lat. adolescentia), f. A., Adoleszenz; F. e In., adolescente. It., adolescenza; P., adolescencia. Época que sigue a la infancia y que se extiende desde los primeros signos de la pubertad hasta que el cuerpo ha adquirido toda su madurez física.

Adormidera:

Planta papaverácea (*Papaversomniferum*) cuyas cápsulas sin madurar, suministran el opio. De las semillas se obtiene un aceite fijo.

Adrenalina:

F., Adrenalín; F., adrénaline; In. Adrenalin; It. Y P., adrenalina. Principio activo de la médula de las cápsulas suprarrenales. En su forma pura es un polvo cristalino, C₆H₃(OH)CHOHCH₃NHCH₈, o Dioxifeniletanolametilamina. Se emplea generalmente el clorhidrato. Obra esencialmente excitando las terminaciones nerviosas del simpático en todos los órganos; inyectado en las venas aumenta la presión arterial y refuerza la acción cardíaca: dilata la pupila y los bronquios e inhibe los movimientos intestinales y las contracciones del útero. Localmente tiene acción hemostática e isquemante poderosa. Sinónimos: Adrenina, adnefrina, epinefrina, paranéfrica, supracapsulina, suprarrenina, suprarrenalita, etc.

Adrenérgico:

Adj. A., adrenergisch; F., adrénérgique; In., adrenergic; It., adrenérgico; P., adrenérgico. Activado o transmitido por la adrenalina; se aplica a las fibras nerviosas y algunas drogas de abuso de tipo excitativo.

Adicción:

Es la necesidad que desarrolla un organismo de una situación, un objeto, o de consumir una sustancia para experimentar sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.

Adicción a Drogas:

Estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una sustancia (natural o sintética).

Adicto:

Persona adicta, dependiente de una o más sustancias.

Alcohol:

Es un fármaco depresor, como tal inhibe y retarda las acciones del sistema nervioso central.

Alcohol etílico o etanol:

Es un depresor primario del Sistema Nervioso Central.

Alcaloide:

(De álcali) y del gr. eidos, aspecto). Sustancias orgánicas de origen vegetal, que poseen propiedades básicas y que forman ácidos sales cristalizables. Desde el punto de vista químico son derivados de la piridina, quinoleína, pirimidina, y en su mayoría, compuestos cuaternarios. El término se aplica también a las sustancias obtenidas por síntesis.

Alcoholemia:

(De alcohol y del gr. Haima, sangre) Presencia de alcohol en la sangre.

Alcohólisis:

F. lisis o desintegración del alcohol.

Alcoholización:

f: A., Alkoholisierung; F., alcoholisation. Tratamiento por la aplicación o inyección de alcohol, especialmente en las neuralgias o síndrome de supresión.

Alcoholofilia o alcoholomanía:

(De alcohol y del gr. philía amistad, o manía, locura). Apetito morboso por las bebidas alcohólicas.

Alcohólico:

Persona que sufre de alcoholismo o síndrome de dependencia del alcohol.

Alcoholismo:

Síndrome de dependencia del alcohol. Enfermedad crónica que consiste en el desorden de la conducta caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto en que se excede de lo que está socialmente aceptado y llega a interferir con la salud del bebedor, así como con sus relaciones interpersonales o con su capacidad para el trabajo.

Alucinación:

(Del lat. alucinatio, onis). F. A., Halluzination. Error mental en la percepción de los sentidos no fundado en una realidad objetiva, percepción imaginaria (táctil, visual, auditiva, olfatoria o gustativa) sin causa exterior. Percepción sin estímulo externo que puede ocurrir en todos los campos sensoriales: auditivo, visual, olfatorio, gustativo y táctil (ver, oír, gustar, y tocar cosas que no existen en la realidad).

Alucinógenos:

También llamados psicométicos, psicoticométicos, psicodislépticos y psicogenéticos. Son sustancias que en el cerebro del sujeto crean alucinaciones, visiones y otras imágenes que no existen en la realidad (LSD, mezcalina, marihuana).

Alucinosis:

f. A., Halluzinose, F., hallucinose, In., hallucinosis. It. Allucinosi, P., alucinose. Psicosis caracterizada por alucinaciones, delirio alucinatorio crónico, síndrome generalmente múltiple, observado sobre todo en el alcoholismo, en el que las alucinaciones se asocian con ideas de persecución. Cuadro observado tras haber tomado sustancias alucinógenas (marihuana, LSD, morfina, cocaína, etc.) o como resultado de una autointoxicación (uremia, exicosis, etc.).

Analgésico:

Droga que alivia el dolor.

Anfetamina:

Sustancia estimulante del sistema nervioso central (SNC). Las sales más comunes derivadas de esta droga son: el sulfato de anfetamina, el sulfato de dextroanfetamina y el hidrocloreuro de metanfetamina (todas son estimulantes del SNC).

Anfetaminas:

Pertenecen al grupo de los estimulantes del sistema nervioso. Por lo tanto, aceleran la actividad mental y producen estados de excitación. Además, reducen el apetito. Por ello, las anfetaminas se usan a veces como medicamentos para tratar la obesidad y algunos casos de depresión mental menor.

Amanita:

Género de hongos que comprende algunas especies muy venenosas como la Amanita Muscaria, A. Phalloides, etc.

Amanitina:

f. Nombre de algunos principios tóxicos obtenidos de hongos del género Amanita, especialmente de uno idéntico a la colina.

Amanitohemolisina:

Glúsido altamente hemolítico que se encuentra en los hongos del género Amanita.

Amanitotoxina:

F. Principio venenoso o toxina de la Amanita Phalloides, Difiere de la phallina en que es más resistente al calor y a la acción de la pepsina y de la pancreatina.

Amapola:

Planta anual de la familia de las papaveráceas (Papaverrheas) cuyos pétalos se emplean en infusión como diaforéticos y ligeramente calmantes. Es una de las cuatro flores béquicas.

Amina:

F. A., Amin. F, e In., amine. Miembro de un grupo de compuestos químicos formados del amoniaco por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por el radical NH₂. Se denominan monoamina, diaminas, triaminas, según sean uno, dos o tres átomos sustituidos.

Anestésico:

(Adj. A., Narkosemitte). Insensible al tacto o al dolor. m. Agente o sustancia que produce anestesia.

Ansia:

(Del lat. anxia. F. de anxius, angustiado). f. Congoja, aflicción.

Ansiedad:

Sensación de temor, depresión o inquietud que surge de anticipar un peligro cuyo origen se desconoce y no se comprende. La angustia se distingue del miedo porque este último sí tiene una causa conocida: se tiene miedo a los animales, a estar solo, a ciertas personas, etc.

Ansiolítico:

Psicofármaco utilizado para reducir la ansiedad.

Ansiolíticos o Timolépticos:

En el individuo normal producen mejoría en los estados depresivo-patológicos sin ser estimulantes. Eso lo hace diferente de los neurolépticos, de los sedantes y los tranquilizantes. Desarrollan más selectivamente y de manera directa, un efecto regulador sobre el humor (benzodiazepinas, meprobamatos, clordiazepóxido, metacualona).

Antidepresores:

Tienen también una función establecida en el tratamiento de los trastornos graves de ansiedad, incluso en síndrome del pánico y la agorafobia, así como la enfermedad obsesiva-compulsiva. Los primeros antidepresores que mostraron eficacia fueron imipramina, amitriptilina, sus derivados y otros compuestos semejantes. Está bien establecida su eficacia para aliviar la depresión mayor y está creciendo su apoyo en su empleo en otros trastornos psiquiátricos.

Antipsicóticos, Neurolépticos:

Tranquilizantes mayores (reserpina, fenotiazina, haloperidol) tienen las siguientes características: Crean un estado de diferencia o desinterés psicoafectivo. No poseen empleados en dosis usuales, una verdadera acción narcótica. Son eficaces en los estados de excitación, agitación psicótica y ansiedad. Reducen la impulsividad y la agresividad. Enmiendan los procesos psicotrópicos de las psicosis aguda, crónica y experimental. Producen manifestaciones de origen vegetativo y extrapiramidal. Su acción dominante sería extracortical. No producen dependencia.

Barbitúricos:

Pertencen al grupo de medicamentos popularmente conocidos como “pastillas para dormir”. Se trata de sustancias cuya función principal es la de deprimir las funciones del sistema nervioso central. Los barbitúricos se producen en forma sintética. Los barbitúricos deprimen con carácter reversible la actividad de todos los tejidos excitables. El sistema nervioso central es particularmente sensible, e incluso cuando se administran en concentraciones anestésicas, son débiles los efectos directos sobre los tejidos periféricos excitables. Sin embargo en caso de intoxicación aguda por barbitúricos sobreviene déficit en las funciones cardiovasculares y periféricas de otras clases.

Barbiturismo:

M. A., Barbiturismus. Intoxicación aguda o crónica por los barbitúricos.

Benzodiacepinas:

Familia de psicofármacos llamados también "tranquilizantes menores", que se prescriben con frecuencia en casos de ansiedad e insomnio.

Cafeína:

Sustancia estimulante que se encuentra en el café, el té y los refrescos de cola. Es probablemente la droga más popular del mundo.

Cafeísmo:

Estado morbozo o intoxicación por abuso de café.

Canabina o cannabina:

Nombre de una resina, de un alcaloide hipnótico de un glucósido de la Cannabis Indica.

Canabinol:

Esencia, derivada de cannabis; parece ser el principio más activo del cáñamo y el componente más eficaz del hachís.

Cannabinomanía:

Canabismo, consumo habitual de cannabis.

Cannabinismo:

Estado morbozo o intoxicación producida por el abuso de cannabis, marihuana o hachís.

Cannabis sativa:

Variedad de cáñamo de cuyas hojas se obtiene la marihuana. Su resina recibe el nombre de "hachís" o "hashish".

Catecolaminas:

Nombre genérico de las aminas derivadas del catecol o 1,2 bencenodiol, las más importantes son la adrenalina y noradrenalina y su predecesor la DOPA (dehidrofenilalanina) de acción simpaticomimética.

Cocaína:

Droga estimulante que proviene de una planta cultivada en algunos países de América del Sur, principalmente en Perú y Bolivia eritropsilon coca. Esta planta requiere un clima templado y húmedo. Alcanza una altura de cerca de un metro y medio. Las hojas son lisas y de forma oval y crecen en grupos de siete en cada tallo.

Codeína:

Se obtiene en su mayor parte de la morfina. Su poder adictivo es mucho menor que el de las drogas anteriores y debe tomarse en grandes cantidades y durante mucho tiempo para causar dependencia. Puede ingerirse o inyectarse. Se presenta en forma de polvo blanco o de tabletas. Como medicamento, la codeína se emplea extensamente en forma de jarabes y tabletas para suprimir la tos. También se usa para aliviar el dolor, aunque sus efectos analgésicos son diez veces menores que los de la morfina.

Consumo de sustancias psicoactivas:

Rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

Crack:

Droga estimulante derivada del clorhidrato de cocaína que habitualmente se fuma.

Craving:

Se refiere al anhelo fuerte, intenso e irreprimible (la mayor parte de las veces), de consumir psicotrópicos u otras sustancias. Esta condición exhibe la pérdida del control sobre el consumo.

Delirio:

Trastorno de las facultades mentales, con alteración de la moral o sin ella, que se manifiesta por lenguaje incoherente, excitación nerviosa e insomnio.

Delirio tóxico:

Estado de confusión agudo con alucinaciones, delirios, agitación y paranoia, provocado por la ingestión de una o más sustancias.

Delirium tremens:

Trastorno mental caracterizado principalmente por la incapacidad para percibir la realidad; confusión, alucinaciones, angustia, temblor generalizado, sudación excesiva, deshidratación y en ocasiones, convulsiones. Se presenta en los alcohólicos crónicos de uno a tres días después de que dejan de beber abruptamente.

Demencia:

Estado de alineación caracterizado por la pérdida o disminución de la mente, de ordinario en correspondencia con lesiones anatómicas de naturaleza destructiva, focales o difusas.

Dependencia cruzada:

La capacidad farmacológica de un agente o clase de sustancias para suprimir las manifestaciones del síndrome de abstinencia, de otras sustancias o clases y mantener el estado físico del dependiente.

Dependencia Física:

Es un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga.

Dependencia Psíquica:

Equivalente al término habituación. Uso compulsivo de la droga sin desarrollo de dependencia física, pero que implica también un grave peligro para el individuo.

Depresión Mental:

Trastorno caracterizado por disminución del tono afectivo, tristeza o melancolía, hipotimia.

Depresor:

Droga psicoactiva que inhibe las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC). El grupo de sustancias depresoras incluye, entre otros, fármacos tales como el alcohol, los barbitúricos y una enorme variedad de sedantes sintéticos y somníferos.

Destoxicación o Desintoxicación:

Reducción de las propiedades tóxicas de los venenos o tóxicos.

Diagnóstico:

Parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una enfermedad fundándose en los síntomas de ésta.

Dosificación:

Determinación y regulación de las dosis.

Dosimetría:

Determinación exacta y sistemática de las dosis.

Dosis:

Cantidad determinada de un medicamento o agente terapéutico.

Depresores:

Disminuyen las reacciones del Sistema Nervioso Central (barbitúricos o alcohol).

Doping:

Uso o manejo de sustancias que artificialmente proveen a un individuo la mejoría e incremento de su capacidad física o psicológica a efecto de potenciar su condición atlética.

Droga ilegal o ilícita:

Es todo fármaco, adictivo o no, que puede causar daño al organismo y al psiquismo y que ha sido incluido en las listas de sustancias prohibidas que la legislación de cada país ha elaborado para los fines de proteger al individuo y a la sociedad.

Droga lícita:

Es cualquier fármaco no incluido en la lista de las sustancias que han sido declaradas ilegales por la legislación de cada país. Las más importantes son los psicofármacos medicinales sujetos a reglamentación, la nicotina contenida en el tabaco, y el etanol (alcohol etílico) de las bebidas alcohólicas.

Droga sintética:

Droga que no tiene un origen vegetal, que ha sido sintetizada en el laboratorio.

Droga:

Desde el punto de vista legal, en México son todas las sustancias que la legislación comprende bajo los términos “estupefacientes y psicotrópicos”.

Droga de impacto:

Se entiende como la droga que el paciente identifica con más capacidad de producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de salud, familiar, legal o laboral, que motiva principalmente la demanda de tratamiento.

Droga de inicio:

De acuerdo con la información aportada por el propio paciente, se refiere a la primera droga consumida.

Drogadicción:

Uso compulsivo de sustancias químicas dañinas al individuo, a la comunidad o a ambos.

Drogas Parasimpaticomiméticas:

Producen efectos similares a los que crea la estimulación de los nervios parasimpáticos.

Drogas Parasimpaticolíticas:

Provocan efectos similares a los producidos por la interrupción de la transmisión en un nervio parasimpático, desarrollando una acción destructiva sobre las fibras del nervio parasimpático o bloqueando la transmisión de los impulsos de éste.

Drogas Psicoanalépticas o Psicotónicas:

Sustancias químicas (estimulantes) que se caracterizan por acelerar las reacciones del Sistema Nervioso Central (anfetaminas).

Drogas Simpaticolíticas:

Bloqueadores de la transmisión de impulsos de las fibras posganglionares a los órganos efectores o tejidos, inhibiendo la contracción del músculo liso y la secreción glandular.

Drogas Simpaticomiméticas:

Producen efectos que semejan los impulsos transmitidos por las fibras posganglionares del Sistema Nervioso Simpático.

Esquizofrenia:

Grupo de trastornos psicóticos caracterizados por desórdenes del pensamiento, del humor y la conducta. Los trastornos del pensamiento pueden llevar a la mala interpretación de la realidad, a los delirios y alucinaciones. La esquizofrenia es la más típica de las psicosis. (En lenguaje popular, “locura”).

Estimulantes:

Drogas que aceleran la actividad mental y que por lo tanto, producen estados de excitación.

Estupefaciente:

Droga psicoactiva narcótica y analgésica que provoca adicción.

Éxtasis (tacha):

Droga sintética de efecto estimulante, de estructura química similar a la anfetamina (de las llamadas drogas “de diseño”).

Farmacodependencia:

Es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces, para evitar el malestar producido por la privación.

Fármacos o Drogas:

Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de sus funciones.

Flashback:

Trastorno que se presenta posterior al consumo de alucinógenos y como consecuencia del mismo, pero sin requerir nueva administración.

Gamahidroxitirato:

GHB, o gamma-hidroxitirato, es un componente normal del metabolismo de los mamíferos; Se encuentran en forma natural en cada célula del cuerpo humano y es considerado como un nutriente. Es un precursor del ácido gama-hidroxitirico.

Hábito:

(Del lat. habitus). Costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto.

Habitación:

Adaptación gradual a un estímulo o medio. Aumento de la tolerancia a una droga desarrollada por su repetida administración.

Hashís, hashish:

Del árabe. Hasis, hierva. Preparación de hojas y sumidades de la cannabis sativa, excitante o sedante del Sistema Nervioso, según las dosis. A dosis moderadas y asociada con café o té, produce una excitación manifiesta de las funciones cerebrales, y en algunos casos genésicos. Resina de la planta de la marihuana (Cannabis sativa).

Heroína:

Es un derivado de la morfina que se produce también mediante procedimientos químicos relativamente sencillos. Sus efectos son de cuatro a diez veces más poderosos que los de la morfina. En su forma pura, es un polvo cristalino blanco tan fino que desaparece al frotarse contra la piel.

Hidrocarburos:

Se refiere a las combinaciones que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de los hidrocarburos alifáticos o de cadenas laterales de los cíclicos, por uno o más grupos hidroxílicos. A grandes dosis es un veneno narcótico que produce intoxicación con incoordinación muscular, delirio y coma.

Hipnótico:

Droga que produce sueño.

Ice:

Droga sintética de efecto estimulante de estructura química similar a la anfetamina. (De las llamadas drogas “de diseño”).

Inhalables:

Forman un grupo especial de los depresores del Sistema Nervioso, constituidos por una serie de sustancias químicas diversas, caracterizados todos por tratarse de gases, líquidos volátiles y aerosoles, que al ser inhalados y absorbidos por vía pulmonar, producen alteraciones de la conciencia, de la percepción, cognición, volición, y debido a la intoxicación primero y después del daño cerebral, son causa de problemas conductuales. (Entre éstas se incluyen pegamentos, lacas, thinner, cementos, gasolina, acetona, etc.).

Intoxicación:

Es un estado mórbido resultante de la presencia de toxinas en el organismo.

Kirsch:

Licor alcohólico obtenido por la fermentación y destilación de las cerezas.

Krocodil:

Droga sintética de fabricación casera, extraída de la codeína, en el proceso se obtiene desomorfinina. Se utiliza en forma inyectada y causa efecto depresor y endurecimiento de los tejidos con tinte verdoso.

LSD: (dietilamida del ácido lisérgico).

Droga sintética psicodisléptica o alucinógena de producción y distribución ilegal. Se deriva de un hongo llamado cornezuelo del centeno. Comúnmente se prepara como un líquido, sin color, sin olor y sin sabor, también se encuentra como polvo, en pequeñas píldoras blancas o de color, como tabletas o cápsulas.

Mal Viaje:

En el argot de los usuarios, se refiere a la mala experiencia dada por el uso de algún determinado psicotrópico.

Marihuana:

Es una droga alucinógena que se puede presentar en diversas formas, se obtiene de una planta llamada cannabis, que tiene las variedades sativa e indica, conocido también como cáñamo indio o simplemente cáñamo. Esta planta se cultiva y también crece silvestre. La altura de la planta varía entre uno y tres o más metros. Las hojas son largas, estrechas y aserradas. Adoptan la forma de abanico. Cada abanico suele tener cinco o siete hojas, pero llega a poseer desde tres hasta quince. Estas hojas son lustrosas y pegajosas y su superficie superior está cubierta por vellos cortos.

Metadona:

Droga sintética adictógena que se utiliza en el tratamiento de la adicción a la heroína.

Metanfetamina:

Droga derivada de las anfetaminas que produce efectos subjetivos semejantes a los causados por la cocaína. La metanfetamina intravenosa o fumada es causa de un síndrome de abuso y dependencia semejante a la que produce la cocaína.

Mezcalina:

Sustancia alucinógena. Es el ingrediente activo obtenido de los capullos de un cacto llamado peyote. El peyote crece principalmente en México. Los capullos pueden masticarse, o bien ser molidos en forma de polvo. Este polvo se coloca en cápsulas para ser ingerido o se usa para fabricar un líquido de color café que se bebe. Los capullos tienen un fuerte sabor amargo.

Morfina:

Prototipo de las drogas opiáceas de efecto analgésico que produce euforia con somnolencia placentera y que posee un alto potencial adictivo. Se extrae del opio mediante un sencillo procedimiento químico.

Narcóticos:

Este término se aplica a las llamadas drogas fuertes que producen un estado de euforia, tranquilidad, modorra, inconsciencia o sueño (morfina, codeína, heroína).

Neuroadaptación:

Es el proceso bioquímico que las neuronas del sistema nervioso central realizan ante la presencia frecuente de una droga psicoactiva, de tal modo que alteran su propia fisiología y por tanto su reactividad a esa sustancia. La tolerancia es la manifestación clínica de esta “adaptación” al fármaco; si el consumo continúa, es frecuente y en dosis elevadas, se presenta el otro fenómeno central de la adicción: el síndrome de abstinencia o de supresión. Tolerancia y síndrome de supresión son, así, la expresión clínica de la neuroadaptación.

Nicotina (tabaco):

Tiene importancia médica considerable por su toxicidad, su presencia en el tabaco y su capacidad para producir dependencia en quienes la consumen. La nicotina es uno de los pocos alcaloides líquidos naturales. Puede ocurrir envenenamiento con nicotina como consecuencia de ingestión accidental en aspersiones insecticidas, en las cuales se encuentra esta sustancia como agente eficaz, lo mismo que en niños que ingieren productos del tabaco.

Opiáceos:

Drogas derivadas del opio que tienen la propiedad común de suprimir el dolor, producir euforia con somnolencia placentera y causar dependencia. Son sustancias de alto potencial adictivo.

Opio:

Líquido resinoso de la cápsula de la amapola o *Papaversomniferum* (planta de opio). El opio cuyo principal ingrediente activo es la morfina, contiene sustancias psicoactivas que pueden extraerse en forma pura, como la codeína. De la morfina se sintetiza la heroína.

Patrón de consumo:

Se refiere a las características del modo o forma con que el consultante mantiene el consumo o uso de un determinado tipo de droga(s) y el orden consecutivo de las diferentes sustancias consumidas desde su inicio.

PCP (Polvo de ángel):

Fenciclidina. Sustancia sintética alucinógena originalmente utilizada como anestésico en veterinaria.

Peyote:

Cactácea originaria de determinadas áreas de México y América Central, del cual se obtiene la mezcalina.

Prevención:

Conjunto de acciones que permiten evitar y detener la historia natural de cualquier enfermedad.

Poliusuario:

Persona que consume dos o más tipos de drogas.

Psicopatológico:

Término que se aplica a las manifestaciones de los trastornos mentales.

Psicosis:

Trastorno mental en el que la capacidad individual para pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicarse, interpretar la realidad y conducirse de manera adecuada se encuentra deteriorada. Suele cursar con delirios y alucinaciones.

Psicotrópico:

Sustancia que altera el funcionamiento mental (pensamiento, juicio, razonamiento, memoria, etc.).

Psilocibina:

Ingrediente activo de la seta *Psilocybe mexicana*. Sustancia psicodisléptica o alucinógena de efectos similares a los de la LSD.

Sedación:

Estado de disminución de las actividades funcionales, de la irritabilidad o del dolor, provocado por una sustancia sedante.

Sedante, sedativo:

Que tiene virtud de calmar o sosegar los dolores o la excitación nerviosa. Proviene del latín *sedare*, que significa calmar o “apaciguar”.

Síndrome de abstinencia:

Conjunto de trastornos físicos y psicológicos que presenta el individuo que ha desarrollado dependencia de una droga cuando suspende su consumo bruscamente o cuando lo disminuye en forma significativa.

Síndrome amotivacional:

Son signos y síntomas clínicos asociados al uso de sustancias, tales como apatía, pérdida de la efectividad, disminución para desarrollar planes a largo plazo, poca tolerancia a la frustración, se altera la capacidad de concentración y dificultad para continuar con rutinas elementales.

Tabaquismo:

Es una enfermedad ocasionada por el consumo de tabaco en donde se afectan todo el organismo, con repercusiones en el área física, mental y social.

THC (Delta-9-tetrahidrocannabinol):

Principal ingrediente activo de la cannabis sativa, a las que se atribuye la mayor parte de las acciones psicoactivas de la planta.

Tolerancia:

Adaptación del organismo a los efectos de la droga; esto implica la necesidad de aumentar la dosis para seguir obteniendo resultados de igual magnitud.

Toxicomanía:

Es una condición que se caracteriza por el envenenamiento del Sistema Nervioso Central, recurrente o continuo, que no responde a motivo médico o terapéutico alguno, sino a los que busca el propio individuo.

Tranquilizantes:

Los ansiolíticos y sedantes, en particular las benzodiazepinas se usan para el tratamiento farmacológico de los trastornos de la ansiedad.

Tratamiento:

Sistema y métodos que se emplean para curar las enfermedades o problemas.

Uso de una droga:

Es el hecho de introducir en un organismo vivo una sustancia mediante prescripción y conforme a la práctica médica.

Uso recreacional:

Consumo de sustancias usualmente referido a las de tipo ilegal bajo circunstancias sociales, a efecto de producir relajación; no necesariamente debe considerarse tal uso como sinónimo de dependencia.

Veneno o tóxico:

Toda sustancia natural o sintética (química) que al ser introducida al organismo por cualquier vía (oral, intramuscular, etc.) causa daños que pueden ser parciales o totales.

Volátil:

Característica de una sustancia que se evapora.

DIRECTORIO

Ing. Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y presidente del
Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Dr. Fernando Petersen Arangúren

Secretario de Salud y Coordinador del
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Lic. Pedro Briones Casillas

Secretario Técnico del Consejo
Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

Dr. Luis Javier Robles Arellano.

Coordinador General del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

Dra. Gloria Gómez Sandoval.

Coordinadora de Enlace del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco.

Mtra. Adriana Ramona Leyva Luna

Investigación en SISVEA

Mtro. Aurelio Martínez García

Investigación en SISVEA

SECRETARÍA DE SALUD
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ADICCIONES
RESULTADOS 2020

LTS. María Patricia Carlín Sánchez.

Capturista y Diseño en Comunicación Visual del SISVEA.

Ing. Héctor Enrique Maury Hernández.

Proceso de Análisis Estadístico

Claudia Mónica Prado Palacios

Información y Difusión

Edición: Junio del 2021